



1º SIMULADO DE

# ENFERMAGEM



Estratégia  
Saúde

# Simulado Especial

## 1º Simulado de Enfermagem

Nome: \_\_\_\_\_

### INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO

- 1 – Este simulado conta com questões focadas em concursos para a área de Enfermagem;
- 2 – A prova contém **40 questões** que abordam conhecimentos cobrados em editais de concursos da área;
- 3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora CESPE/CEBRASPE.
- 4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do Estratégia Concursos;
- 5 – Os participantes têm das **8:30 às 13:00** para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;
- 6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF;
- 7 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia Concursos.
- 8 – Esse simulado é uma autoavaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível na área do aluno.

**PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - <http://bit.ly/Simulado-Enfermagem-22-08-20>**

- |  |  |
|--|--|
| 01 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 25 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 02 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 26 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 03 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 27 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 04 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 28 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 05 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 29 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 06 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 30 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 07 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 31 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 08 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 32 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 09 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 33 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 10 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 34 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 11 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 35 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 12 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 36 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 13 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 37 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 14 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 38 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 15 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 39 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 16 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E | 40 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |
| 17 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |  |
| 18 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |  |
| 19 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |  |
| 20 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |  |
| 21 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |  |
| 22 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |  |
| 23 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |  |
| 24 – <input type="radio"/> C <input type="radio"/> E |  |

**SUS E TEMAS RELACIONADOS**

Lígia Carvalheiro

**01.** Julgue os itens a seguir, acerca da Lei Orgânica do SUS:

I As conferências de saúde acontecem em forma ordinária a cada quatro anos em todas as esferas de governo.

II A representação dos usuários nos conselhos de saúde terá maior número de participantes que nas conferências de saúde e no conjunto dos demais segmentos.

III Essa lei regula, em todo território nacional, as ações e os serviços de saúde executados isolados ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas o item I está certo.
- b) Apenas o item II está certo.
- c) Apenas os itens I e III estão certos.
- d) Apenas os itens II e III estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

**02.** Um dos objetivos da Política Nacional de Educação Popular em Saúde no Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS) é fortalecer a gestão participativa nos espaços do SUS. Um cidadão que participe dessa gestão deve saber que, entre os princípios do PNEPS-SUS, está o(a)

- a) cuidado.
- b) amorosidade.
- c) comunicação.
- d) humanização.
- e) respeito às diferenças.

**03.** A lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública no serviço de saúde público e no privado, em todo o território nacional, é definida por portaria do Ministério da Saúde. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

a) A comunicação de doenças, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória deve ser

realizada exclusivamente por autoridade de saúde e por profissionais ligados ao SUS.

b) A epizootia, que tem importância nacional para fins de notificação compulsória, constitui doença ou morte de animais ou grupos de animais que podem apresentar risco à saúde pública.

c) A notificação compulsória semanal dos casos confirmados de doenças ou agravos deve ser feita ao Ministério da Saúde pelo local de atendimento ao paciente.

d) A Polícia Federal garantirá o sigilo das informações pessoais integrantes da notificação compulsória que esteja sob responsabilidade das autoridades de saúde.

e) Febre de Chikungunya e doença aguda pelo vírus da zika em gestante estão fora da lista de doenças ou agravos de notificação compulsória, porque foram catalogadas recentemente.

**04.** Entre outros aspectos, o trabalho das equipes de atenção à saúde da família é caracterizado pelo(a)

- a) recebimento de incentivo financeiro mensal para o custeio de unidade móvel.
- b) atenção no domicílio, em escolas, creches, praças e outros locais da comunidade.
- c) atribuição de competência aos gestores municipais de saúde para a composição das referidas equipes.
- d) realização das atividades da equipe de forma itinerante.
- e) limitação do livre acesso da população para atendimento individual.

**05.** Assinale a opção que apresenta corretamente o conceito do princípio da integralidade da saúde no Sistema Único de Saúde (SUS).

a) Priorização da oferta de ações e serviços aos segmentos populacionais que enfrentam maiores riscos de adoecer e morrer em decorrência da desigualdade social

b) Ações de promoção, recuperação e reabilitação da saúde e prevenção de riscos, com garantia de continuidade do atendimento na rede de serviços de saúde, abrangendo-se as dimensões biológicas, psicológicas e sociais.

- c) Distribuição racional dos recursos de saúde no território brasileiro, de acordo com as necessidades da população.
- d) Ordenação do sistema de saúde e o estabelecimento de fluxos assistenciais entre os serviços.
- e) Atendimento disponível a todos os cidadãos, independentemente da classe social, cor, crença religiosa, idade, escolaridade e local de residência.

### **FUNDAMENTOS, GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM**

**Ligia Carvalheiro**

**06.** Com relação ao Código de Ética e Deontologia dos Profissionais de Enfermagem, julgue os itens a seguir.

I É proibido ao enfermeiro provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, incluídos os casos permitidos pela legislação vigente.

II É direito do profissional o acesso às informações relacionadas a pessoas, família e coletividade, e necessárias ao exercício profissional.

III É proibido aos profissionais de enfermagem promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa.

IV Consiste a censura na admoestação ao infrator, de forma reservada, devendo ser registrada no prontuário do infrator, na presença de duas testemunhas.

Estão certos apenas os itens

- a) II.
- b) III.
- c) IV.
- d) II e III.
- e) III e IV.

**07.** Segundo as orientações dos Cadernos de Atenção Básica de 2014, do Ministério da Saúde, assinale a opção correta quanto ao rastreamento e ao diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica (HAS).

- a) Indivíduos que apresentam pressão arterial (PA) anormal na monitoração em consultório e PA

normal na residência têm diagnóstico de hipertensão mascarada.

- b) A pressão arterial, em ordem crescente, pode ser classificada como limítrofe, normotensão e HAS.

- c) As estratégias de prevenção consideradas para a HAS são a populacional e a dirigida a grupos de risco.

- d) O controle e o tratamento da HAS são realizados com medicamentos que apresentam muitos efeitos colaterais e baixa aplicabilidade.

- e) Adultos com mais de dezoito anos de idade devem ter sempre a sua pressão arterial aferida quando forem a uma unidade básica de saúde para consultas.

**08.** São denominados lesões por pressão os danos localizados na pele e(ou) em tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea, causados por pressão intensa e(ou) prolongada, em combinação com o cisalhamento do tecido. Classifica-se como lesão de estágio 3 a lesão por pressão caracterizada por

- a) pele intacta ou não, com presença de bolha com exsudato sanguinolento.

- b) perda da pele em sua espessura total e perda tissular.

- c) pele íntegra com área localizada de eritema que não embranquece.

- d) perda da pele em sua espessura total, com visibilidade do tecido adiposo.

- e) perda da pele em sua espessura parcial, com exposição da derme.

**09.** Em uma unidade de saúde, foram prescritas 60 unidades internacionais (UI) de insulina NPH, a serem administradas por via subcutânea, a um paciente diabético. Ao preparar a medicação, no entanto, o profissional de enfermagem notou que não havia seringas próprias para UI, estando disponíveis apenas seringas de 3 mL. Nesse caso, para atender à prescrição, o profissional deve aspirar nessa seringa o volume de insulina NPH correspondente a

- a) 0,60 mL.

- b) 1,20 mL.

- c) 0,06 mL.
- d) 0,12 mL.
- e) 0,20 mL.

**10.** De acordo com a legislação que dispõe sobre o exercício da enfermagem, é facultado ao técnico de enfermagem, caso considere adequado, facilitar a fiscalização do exercício profissional a ser realizada por órgão competente.

- a) é facultado ao técnico de enfermagem, caso considere adequado, facilitar a fiscalização do exercício profissional a ser realizada por órgão competente.
- b) as infrações éticas observadas durante o trabalho em unidades de saúde devem ser comunicadas ao Conselho Regional de Enfermagem somente nos casos de interesse do trabalhador.
- c) técnicos de enfermagem estão habilitados a atuar tanto na jurisdição em que estão inscritos como nas outras jurisdições, sendo desnecessária a transferência da inscrição.
- d) a inscrição nos conselhos regionais de enfermagem é obrigatória aos enfermeiros e técnicos de enfermagem, embora seja facultativa no caso de auxiliares de enfermagem.
- e) obrigatório ao profissional de enfermagem, caso encerre suas atividades na área, solicitar o cancelamento de sua inscrição no conselho regional ao qual estiver vinculado.

## SAÚDE PÚBLICA

Thaysa Vianna

**11.** Com capacidade civil plena, casado e sem filhos, Francisco buscou o serviço de saúde a fim de obter informações a respeito de planejamento familiar.

Julgue os itens a seguir, acerca das informações que, de acordo com a legislação que trata do assunto, devem ser repassadas a Francisco, quanto às condições para que ele possa se submeter à esterilização.

I. É necessário manifestar por escrito sua vontade de realizar o procedimento.

II. É necessário apresentar consentimento expresso de sua esposa.

III. Para pessoas com menos de dois filhos, a idade mínima é de vinte e cinco anos

Assinale a opção correta.

- a) Apenas o item I está certo.
- b) Apenas o item II está certo.
- c) Apenas o item III está certo.
- d) Apenas os itens I e III estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

**12.** Caso a data da última menstruação de uma gestante tenha sido em 13 de setembro de 2015, a data provável do parto, aplicando-se a Regra de Nägele, é de:

- a) 13/06/2016
- b) 20/03/2016
- c) 13/05/2016
- d) 20/06/2016.
- e) 22/04/2016

**13.** Com base nas recomendações do Ministério da Saúde, julgue os itens a seguir, acerca das orientações nutricionais a serem repassadas por um técnico em enfermagem a uma paciente em gestação de baixo risco, com o objetivo de prevenir o desenvolvimento de anemia ferropriva.

I. A paciente deve consumir diariamente alimentos de origem animal ou vegetal ricos em ferro.

II. É recomendado à gestante o consumo frequente de sal de cozinha, que, no Brasil, é enriquecido com ferro.

III. A partir da oitava semana de gestação, a paciente deve buscar o serviço de saúde para receber suplementação de ferro.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas o item I está certo.
- b) Apenas o item II está certo.
- c) Apenas o item III está certo.
- d) Apenas os itens I e III estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

**14.** Acerca do método canguru, política de saúde instituída pelo Ministério da Saúde voltada para a atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso e à humanização da assistência neonatal, assinale a opção correta.

- a) As estratégias relacionadas a essa metodologia, além do contato pele a pele e a posição canguru, são o cuidado individualizado do recém-nascido, a participação dos familiares nos cuidados com o bebê, o incentivo e o apoio à amamentação e a aplicação do protocolo de dor.
- b) O método canguru foi desenvolvido para ser aplicado fora da unidade intensiva neonatal, devido às especificidades desse espaço que impedem a aplicação de estratégias eficazes voltadas para o contato pele a pele, mãe e filho.
- c) A alta do método canguru se dá com a alta hospitalar do recém-nascido.
- d) A posição canguru deve ser realizada até que o bebê obtenha 2.500 kg, momento em que a mãe poderá dividir o leito com o recém-nascido, colocando-o ao seu lado na cama.
- e) Com base na estratégia de disseminação do método pelo Brasil, gestores e consultores da Coordenação Geral da Saúde, seguidos pelos tutores dos centros de referência nacional, atuam como coordenadores, hierarquicamente superiores, dos profissionais que trabalham junto aos recém-nascidos.

**15.** Uma criança de um mês de vida foi atendida em uma unidade de saúde para consulta de rotina com enfermeiro. A mãe relatou que a criança havia apresentado, três dias atrás, fezes diarreicas e que, no dia da consulta, as fezes estavam com sangue. Ao ser examinado, o bebê pareceu tranquilo enquanto mamava, mas ficou inquieto e irritado ao deixar o peito. O enfermeiro verificou, com a criança em condições basais, frequência respiratória de sessenta e cinco movimentos por minuto e que, ao pesquisar o sinal da prega, a pele da criança havia voltado ao seu estado anterior muito lentamente.

A respeito desse caso clínico, assinale a opção correta.

- a) Considerando a faixa etária da criança, a frequência respiratória encontrada está compatível com a normalidade.

b) Textura seca é o sinal evidenciado pelo retorno da pele durante a pesquisa da prega cutânea, procedimento que deve ser realizado sempre na região supraclavicular do bebê, fazendo-se uma pinça com as pontas dos dedos.

c) A classificação do estado de hidratação apresentado pelo bebê é desidratação grave, o que indica a necessidade de tratamento imediato.

d) Cabe ao profissional de enfermagem aconselhar a mãe a suspender imediatamente a amamentação e, quando prescrito, administrar 0,5 mg de vitamina K intramuscular.

e) O profissional de enfermagem deve indicar a ingestão de líquidos adicionais, devendo a mãe seguir o tratamento em casa, oferecendo o soro de reidratação oral ao bebê, juntamente com o leite materno, e retornar ao serviço de saúde caso a criança apresente piora.

**16.** A osteoporose é um acontecimento comum no climatério e cada vez mais presente no contexto do envelhecimento populacional. Dessa forma, os profissionais de saúde devem estar preparados para prestar orientações nesse sentido. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta.

a) A prática regular de exercícios físicos ou caminhada vigorosa não deve ser incentivada como tratamento para as mulheres em fase de climatério, pois há grandes chances de ocorrência de quedas e fraturas na menopausa.

b) A osteoporose tem prevalência apenas após a menopausa, não havendo tratamento disponível, exceto para o controle da dor.

c) A dor relacionada à osteoporose é um indicativo de que a paciente é poliqueixosa.

d) A reposição hormonal deve ser incentivada para todas as mulheres em fase de climatério como o melhor tratamento da atualidade e poderá ser esclarecida pela equipe de enfermagem quanto aos seus benefícios.

e) Observadas às especificidades de cada caso, a equipe de saúde poderá orientar, para paciente em fase de climatério, uma dieta variada e rica em vitamina D e cálcio, a exposição ao banho de Sol diariamente por curtos períodos de tempo, a realização de exercícios físicos adequados e a

necessidade de algum suplemento prescrito por médicos ou nutricionistas, quando for o caso.

**17.** A hipertensão arterial é a doença que mais frequentemente complica a gravidez, sendo responsável pelo maior índice de morbidade e mortalidade materna e perinatal. Por isso, é fundamental o diagnóstico precoce e preciso em caso de pré-eclâmpsia, diferenciando-a da hipertensão primária ou crônica preexistentes. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- a) Compreende um quadro de pré-eclâmpsia de urgência a pressão arterial diastólica inferior a 110 mmHg com presença de sintomatologia clínica.
- b) Nas emergências hipertensivas, recomenda-se controlar a pressão o mais rapidamente possível; nas urgências hipertensivas, o controle pode ser gradual, em um período de até 48 horas.
- c) A pré-eclâmpsia apresenta-se quando o nível da pressão arterial for maior ou igual a  $140 \text{ mmHg} \times 90 \text{ mmHg}$ , com proteinúria ( $> 300 \text{ mg}/24\text{h}$ ).
- d) A mulher que tem doença renal progressiva, mesmo que sua função renal esteja relativamente preservada, deve ser desencorajada a ter filhos, pelo alto risco de apresentar quadro de pré-eclâmpsia.
- e) O termo pré-eclâmpsia foi criado por Louis Weinstein, para caracterizar as pacientes com sintomas antecessores à eclâmpsia.

**18.** Considerando as orientações nacionais para atenção à mulher no climatério e menopausa, julgue os itens que se seguem

I- Recomenda-se a realização de mamografia bianualmente para mulheres a partir dos quarenta anos de idade.

II- O rastreamento com a mamografia para detecção precoce do Câncer de Mama é considerado uma ação de prevenção secundária.

III- Entre os maiores fatores de risco para osteoporose está a menopausa tardia.

- a) Apenas I e II estão corretas
- b) Apenas I está correta
- c) Todas as alternativas estão corretas
- d) Apenas II está correta

e) Todas as alternativas estão incorretas

**19.** Entre os sinais abaixo qual é considerado um sinal de probabilidade de gravidez?

- a) Aumento do volume das mamas.
- b) Saída de colostro pelo mamilo.
- c) Tubérculos de Montgomery.
- d) Ausculta do BCF fetal.
- e) Positividade da fração beta do HCG.

**20.** Acerca de cuidados à gestante em fase pré-natal de baixo risco, responda:

Na ausculta dos batimentos cardíofetais, é considerada normal a frequência cardíaca fetal entre:

- a) 90 bpm e 110 bpm.
- b) 60 a 100 bpm
- c) 100 a 140 bpm
- d) 130 a 140 bpm
- e) 110 a 160 bpm

### **URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E UTI**

**Lorena Campos**

**21.** Um enfermeiro que esteja auditando a rede de atenção às urgências deverá conhecer suas diretrizes, que incluem o(a):

- a) controle social dos usuários sobre os serviços.
- b) ampliação do acolhimento aos casos crônicos em todos os pontos de atenção.
- c) repactuação federativa, visando a uma solidária, responsável e compartilhada divisão de custos.
- d) efetivação de um modelo centrado no processo de atenção e baseado nas necessidades de uma equipe multiprofissional.
- e) organização das regiões de saúde e das redes de atenção a partir da racionalização de custos e do respeito ao pacto federativo.

22. Um paciente admitido em unidade de pronto-socorro com trauma abdominal fechado e com taquicardia, pulso filiforme, extremidades frias, diminuição da turgidez cutânea, olhos encovados, diminuição do nível de consciência, taquipneia e hipotensão apresenta quadro de choque:

- a) séptico.
- b) cardiogênico.
- c) hipovolêmico.
- d) neurogênico.
- e) anafilático.

23. Muito frequentes na terapia intensiva, os choques podem ser classificados de acordo com sua etiologia, independentemente da causa básica da internação do paciente. A partir dessas informações, assinale a opção que indica, corretamente, a causa prevalente e a respectiva classificação do choque.

- a) infarto do miocárdio – choque neurogênico
- b) queimaduras extensas – choque hipovolêmico
- c) ingestão de alergênicos – choque obstrutivo
- d) infecção generalizada – choque cardiogênico
- e) lesões medulares – choque distributivo

24. A parada cardiorrespiratória (**PCR**) pode ser ocasionada por diversos mecanismos que perturbam a homeostase do sistema condutor cardíaco. Na ocorrência de **PCR**, a realização imediata de reanimação cardiopulmonar (**RCP**) contribui sensivelmente para o aumento das taxas de sobrevivência das vítimas. No que se refere a esse tema, assinale a opção correta.

- a) Se constatada a ausência do pulso carotídeo em vítima de **PCR**, devem-se iniciar imediatamente as compressões torácicas, sendo recomendado atualmente realizar vinte compressões torácicas com pausa para uma ventilação de resgate.
- b) Para conseguir êxito na realização de **RCP**, o socorrista deve realizar uma frequência mínima de cem compressões por minuto, deprimindo o tórax com profundidade mínima de cinco centímetros e promovendo o alívio do tórax após cada compressão.

c) O suporte básico de vida compreende uma série de intervenções, englobando o acesso precoce, a desfibrilação precoce e o atendimento de suporte avançado precoce.

d) Os sinais premonitórios da **PCR**, como arritmia, hipotensão, fraqueza, dor torácica, dispneia e visão turva, estão sempre presentes e surgem até duas horas antes do evento terminal.

e) Na vigência de **PCR**, cujo diagnóstico deve ser confirmado laboratorialmente, a vítima torna-se irresponsiva, apneica e pode ou não ter pulso.

25. De acordo com as novas diretrizes, de 2015, da American Heart Association a respeito do suporte básico de vida, ao realizar a reanimação cardiopulmonar de um adulto, o profissional de saúde deve:

- a) aplicar a sequência universal de A-B-C (via aérea, respiração, compressões).
- b) garantir a segurança do local de atendimento e, em seguida, ligar para o resgate, que dará por telefone as orientações que deverão ser seguidas.
- c) realizar compressões cardíacas na taxa de oitenta a cem por minuto.
- d) alternar, a cada dez compressões, uma ventilação intensa, interrompendo-a para a verificação do pulso
- e) checar a respiração e o pulso ao mesmo tempo e iniciar as compressões torácicas caso seja detectada a parada cardiorrespiratória.

26. De acordo com os protocolos de suporte básico de vida do serviço de atendimento móvel de urgência do Sistema Único de Saúde (SUS), em caso de obstrução de vias aéreas por corpos estranhos, o enfermeiro deve

- a) incentivar a tosse vigorosa em quaisquer pacientes responsivos.
- b) executar a manobra de Heimlich em quaisquer pacientes com obstrução grave.
- c) executar compressões torácicas em pacientes irresponsivos, sem respiração, mas com pulso.
- d) reconhecer como obstrução leve aquela que permite ao paciente respirar, ainda que de forma ruidosa.

e) abster-se de recorrer à manobra de Heimlich nos casos de obstrução em que o paciente seja obeso ou uma gestante no último trimestre.

**27.** Assinale a opção em que é apresentada corretamente a menor pontuação possível, indicadora de coma profundo, de paciente com lesão cranioencefálica, conforme a escala de coma de Glasgow.

- a) 4
- b) 5
- c) 1
- d) 2
- e) 3

**28.** A cobertura microambiental utilizada como curativo secundário para uma ferida infectada, infiltrada e de formato irregular, derivada de glicídio de cadeia longa e obtido a partir de algas, e que possui a capacidade de absorver grande quantidade de secreção denomina-se:

- a) película semipermeável.
- b) gaze de algodão
- c) acetato de mafenida.
- d) alginato.
- e) hidrocoloide.

**29.** De acordo com o **Manual para Cirurgia Segura da Organização Mundial da Saúde**, assinale a opção correta referente à assistência de enfermagem perioperatória.

- a) A pausa cirúrgica para a confirmação do paciente, do procedimento e do local da cirurgia é etapa exclusiva dos médicos.
- b) A coleta de dados acerca de cirurgias e os resultados de análises estatísticas desses dados contribuem para a melhoria na qualidade da assistência à saúde e, conseqüentemente, para o cuidado de pacientes mais doentes
- c) O controle da hipoglicemia e a redução de peso de pacientes obesos não têm relação com os métodos de prevenção de infecções de sítios cirúrgicos.

d) Em vítimas de trauma com hemorragia, o único procedimento a ser adotado, antes da chegada do paciente ao hospital, é a tentativa de controle da hemorragia externa por pressão manual.

e) É prioritária a segurança na anestesiologia obstétrica, pois pacientes obstétricas estão expostas a risco anestésico particularmente alto.

**30.** A respeito da escala de coma de Glasgow (**ECG**), assinale a opção correta.

a) Em pacientes entubados, não há necessidade de avaliação da resposta verbal, sendo a pontuação da **ECG** obtida pela soma dos demais quesitos.

b) Um paciente com abertura ocular ao comando verbal e que não emita nenhuma resposta e retire o membro ao estímulo doloroso apresentará doze pontos na **ECG**.

c) A **ECG** baseia-se na quantificação de três variáveis, pontuando-se cada uma de acordo com a melhor resposta obtida durante o exame e somando-se os resultados, que podem indicar uma pontuação entre 3 e 15.

d) A classificação do paciente de acordo com a **ECG** independe do fato de o paciente estar utilizando medicamentos.

e) A resposta motora é avaliada e pontuada em cinco níveis, recebendo a menor nota o paciente que obedece aos comandos espontaneamente.

### **PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO E AGRAVOS À SAÚDE**

**Guilherme Gasparini**

**31.** Clinicamente, a sífilis desenvolve-se em três estágios, caracterizados por diferentes sintomas. Na fase latente da doença, o paciente apresenta

a) proliferação de treponemas nas lesões, o que justifica a titulação elevada nos exames sorológicos realizados nesta fase.

b) uma ou mais erupções indolores na pele e na mucosa, denominadas cancrs duros, com secreção serosa escassa e de curta duração.

- c) sinais subclínicos da doença, que, nesse estágio, é diagnosticada por meio de testes sorológicos, tais como o de imunofluorescência indireta.
- d) múltiplas lesões ulceradas, que provocam dor prolongada e intensa e apresentam base endurecida e fundo liso e brilhante.
- e) alta carga bacteriana no sangue, comprovável em exames sorológicos do tipo ELISA (*enzyme-linked immunosorbent assay*).

**32.** As infecções sexualmente transmissíveis são frequentes e têm múltiplas etiologias e apresentações clínicas, além de causarem impacto negativo na qualidade de vida das pessoas, podendo afetar as relações interpessoais. A respeito dessas infecções, assinale a opção correta.

- a) Define-se como caso confirmado de sífilis adquirida toda evidência clínica de sífilis primária ou secundária em indivíduo com teste não treponêmico reagente com qualquer titulação e teste treponêmico reagente, ou o quadro de indivíduo assintomático com teste não treponêmico reagente com qualquer titulação e teste treponêmico reagente.
- b) A oftalmia neonatal, definida como conjuntivite purulenta do recém-nascido, ocorre a partir do terceiro mês de vida, devido ao longo período de incubação do agente etiológico e pode levar à cegueira, principalmente se causada pelo *Treponema pallidum*.
- c) O vírus da hepatite B apresenta baixa infectividade e, quando está fora do corpo, ele se torna inativo.
- d) O papiloma vírus humano é um vírus de RNA que pode induzir uma grande variedade de lesões proliferativas.
- e) O diagnóstico do condiloma acuminado é laboratorial e complementado pelos exames de colonoscopia e broncoscopia.

**33.** Em relação a doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), assinale a opção correta.

- a) A sífilis congênita não pode ser considerada um indicador no processo de avaliação de qualidade da assistência à gestante.

- b) As lesões das fases primária e secundária da sífilis apresentam baixa infectividade, o que torna dispensável o uso de luvas pelo profissional de saúde durante a manipulação das lesões.
- c) A vigilância epidemiológica das DSTs tem como base a notificação tardia, procedimento que se completa com o estado de prevalência nos grupos de risco.
- d) A gonorreia acomete apenas as regiões dos órgãos genitais.
- e) A doença infecciosa causada pelo papilomavírus (HPV), conhecida como condiloma acuminado, verruga genital ou crista de galo, é transmitida frequentemente por meio de contato sexual.

**34.** Assinale a opção em que são apresentadas as manifestações clínicas da infecção causada pelo agente *Trichomonas Vaginalis*.

- a) prurido vulvovaginal, corrimento branco, grumoso, com aspecto caseoso, acompanhado de fissuras e maceração da pele
- b) secreção vaginal amarelada, acompanhada de lesões exofíticas (crista de galo), dor pélvica intensa e polaciúria
- c) secreção vaginal em pequena quantidade, com odor assemelhado a odor de peixe, associada a sintomas de poliúria
- d) prurido, dor, área infectada edemaciada e lesões vesiculares que coalescem em formato de crosta
- e) secreção vaginal abundante, espumosa, de coloração amarelada a amarelo-esverdeada, irritativa, de odor fétido, acompanhada de sintomas urinários e hiperemia de mucosa

**35.** Assinale a opção correta acerca das doenças sexualmente transmissíveis.

- a) O condiloma acuminado provoca o surgimento de verrugas genitais, é de difícil diagnóstico e é causado por uma bactéria.
- b) O gonococo que causa a gonorreia provoca sintomas de dor ao urinar e limita-se a uma infecção superficial local, pois não é capaz de migrar para outros sítios.

- c) A sífilis, causada por uma bactéria chamada *Treponema pallidum*, pode atingir qualquer órgão e evoluir cronicamente.
- d) O herpes genital é causado pelo mesmo microrganismo da donovanose e tem o tratamento semelhante à base de antibióticos.
- e) O HPV é um vírus que vive na pele e nas mucosas dos seres humanos, tais como vulva, vagina, colo de útero e pênis. Quando não é tratado nas meninas, torna-se a principal causa do desenvolvimento do câncer de pele.

**36.** Acerca dos conceitos e critérios diagnósticos das infecções hospitalares, assinale a opção correta.

- a) Resultados de exames de laboratório e pesquisa de antígenos não são critérios para diagnóstico das infecções hospitalares.
- b) Não são consideradas infecções hospitalares aquelas manifestadas antes de setenta e duas horas da internação, quando associadas a procedimentos.
- c) As infecções de recém-nascidos associadas com bolsa rota superior a vinte e quatro horas são hospitalares.
- d) A infecção adquirida durante a admissão do paciente e que se manifeste na internação ou após a alta, ainda que possa ser relacionada com a internação, não caracteriza hospitalar.
- e) O diagnóstico das infecções hospitalares deverá valorizar informações oriundas de evidência clínica, derivada da observação direta do paciente ou da análise do seu prontuário.

**37.** De acordo com a classificação dos tipos de cirurgia, segundo o potencial de contaminação, é correto afirmar que as cirurgias

- a) contaminadas são realizadas em tecidos quando há presença de secreção purulenta, área necrótica ou corpo estranho, perfuração de víscera ou contaminação fecal.
- b) limpas são realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação, na ausência de processo infeccioso, sem penetração nos tratos respiratório, digestório e geniturinário.
- c) potencialmente contaminadas são realizadas em tecidos colonizados por flora bacteriana abundante

de difícil descontaminação, decorrente trauma penetrante há menos de quatro horas e feridas crônicas abertas.

- d) infectadas são as realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana residente pouco numerosa ou em tecido de difícil descontaminação.
- e) limpas são aquelas realizadas em tecidos colonizados por flora residente, em local com objeto encravado.

**38.** Em relação aos cuidados relativos à lavagem das mãos, assinale a opção correta.

- a) Se as mãos tocarem a pia durante a lavagem, deve-se repetir a lavagem, pois a pia é uma área contaminada.
- b) Ao utilizar antisséptico, não é necessário friccionar as mãos até que o álcool esteja seco.
- c) As unhas devem ser curtas, embora não haja um tamanho recomendado.
- d) Não há ordem para a secagem das mãos, apenas para a lavagem.
- e) Não é preciso inspecionar as mãos quanto à sujidade visível; toda sujidade será eliminada durante a lavagem.

**39.** A respeito do tétano, doença infecciosa aguda, não contagiosa, causada pela ação de exotoxinas produzidas pelo *Clostridium tetani*, que provoca um estado de hiperexcitabilidade do sistema nervoso central, assinale a opção correta.

- a) O agente etiológico do tétano é um bacilo gram-positivo, anaeróbio e capaz de produzir esporos que lhe permitem sobreviver no meio ambiente por vários anos.
- b) O tétano acidental tem período de transmissibilidade de dez a quatorze dias.
- c) O principal modo de transmissão do tétano neonatal é o contato direto entre recém-nascidos.
- d) O período de incubação tanto do tétano acidental como do tétano neonatal é de trinta a quarenta dias.
- e) O *C. tetani* é comumente encontrado na natureza sob a forma vegetativa e no trato intestinal do cavalo e do homem.

**40.** Os artigos hospitalares devem ser submetidos aos processos de limpeza, desinfecção ou esterilização, pois, independentemente do processo a serem submetidos, todo artigo deverá ser considerado como contaminado. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- a) Estetoscópio, termômetro e esfigmomanômetro são considerados artigos não críticos.
- b) O uso do EPI não é imprescindível à pessoa que manuseia artigos contaminados.
- c) Os artigos destinados ao contato com a pele íntegra do paciente são denominados artigos semicríticos e requerem limpeza ou desinfecção de baixo ou médio nível.
- d) Artigos não críticos são destinados ao contato com a pele não íntegra ou com mucosas íntegras e requerem desinfecção de médio ou alto nível de esterilização.
- e) Os artigos semicríticos são destinados à penetração através da pele e das mucosas nos tecidos subepiteliais e no sistema vascular.

# Preencha o Gabarito

<http://bit.ly/Simulado-Enfermagem-22-08-20>

## NÃO É ASSINANTE?

*Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!*

<https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas>

## CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES!

*Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link conheça!*

<https://bit.ly/Sistemas-de-Questões>

---