



Simulado Final

PM RJ

Técnico de Enfermagem

Simulado

Simulado PM RJ - Técnico de Enfermagem - Banca: IBADE

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso PM RJ (Técnico de Enfermagem);
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - Os participantes têm das **8:00** às **13:30** para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo abaixo destas informações;

PREENCHA SEU GABARITO

<https://bit.ly/Simulado-PM-RJ-23-09>

- | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 - A B C D E | 20 - A B C D E | 41 - A B C D E | 61 - A B C D E |
| 02 - A B C D E | 21 - A B C D E | 42 - A B C D E | 62 - A B C D E |
| 03 - A B C D E | 22 - A B C D E | 43 - A B C D E | 63 - A B C D E |
| 04 - A B C D E | 23 - A B C D E | 44 - A B C D E | 64 - A B C D E |
| 05 - A B C D E | 24 - A B C D E | 45 - A B C D E | 65 - A B C D E |
| 06 - A B C D E | 25 - A B C D E | 46 - A B C D E | 66 - A B C D E |
| 07 - A B C D E | 26 - A B C D E | 47 - A B C D E | 67 - A B C D E |
| 08 - A B C D E | 27 - A B C D E | 48 - A B C D E | 68 - A B C D E |
| 09 - A B C D E | 28 - A B C D E | 49 - A B C D E | 69 - A B C D E |
| 10 - A B C D E | 29 - A B C D E | 50 - A B C D E | 70 - A B C D E |
| 11 - A B C D E | 30 - A B C D E | 51 - A B C D E | 71 - A B C D E |
| 12 - A B C D E | 31 - A B C D E | 52 - A B C D E | 72 - A B C D E |
| 13 - A B C D E | 32 - A B C D E | 53 - A B C D E | 73 - A B C D E |
| 14 - A B C D E | 33 - A B C D E | 54 - A B C D E | 74 - A B C D E |
| 15 - A B C D E | 34 - A B C D E | 55 - A B C D E | 75 - A B C D E |
| 16 - A B C D E | 35 - A B C D E | 56 - A B C D E | 76 - A B C D E |
| 17 - A B C D E | 36 - A B C D E | 57 - A B C D E | 77 - A B C D E |
| 18 - A B C D E | 37 - A B C D E | 58 - A B C D E | 78 - A B C D E |
| 19 - A B C D E | 38 - A B C D E | 59 - A B C D E | 79 - A B C D E |
| 20 - A B C D E | 39 - A B C D E | 60 - A B C D E | 80 - A B C D E |

DEONTOLOGIA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL*Breno Caldas*

01. Segundo a Lei nº 7.498/86, dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências, compete ao Técnico de Enfermagem:

- a) prescrição da assistência de enfermagem.
- b) educação visando à melhoria de saúde da população.
- c) Prescrição da assistência de Enfermagem
- d) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.
- e) participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.

02. De acordo com a Lei n. 7.498/86, a Enfermagem é exercida privativamente pelo(a) Enfermeiro(a), pelo(a) Técnico(a) de Enfermagem, pelo(a) Auxiliar de Enfermagem e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. Considerando essa lei, é correto afirmar que:

- a) na ausência do(a) Enfermeiro(a), o Técnico de Enfermagem pode executar as atividades privativas do(a) Enfermeiro(a).
- b) É atribuição do Enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde.
- c) É Enfermeiro o titular do diploma ou certificado a que se refere o inciso III do art. 2º da Lei nº 2.604, de 17 de setembro de 1955, expedido até a publicação da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961.
- d) É atribuição do Técnico de Enfermagem, como integrante da equipe de saúde, a prescrição da assistência de Enfermagem.
- e) compete ao Técnico de Enfermagem o acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.

03. É dever profissionais de enfermagem, conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem:

- a) registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras.
- b) realizarem e participarem de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente.
- c) Ter reconhecida sua autoria ou participação em pesquisa, extensão e produção técnico-científica.
- d) Requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional/usuários quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Coren e assegurando a continuidade da assistência de Enfermagem.
- e) abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.

04. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN Nº 564/2017), é proibido:

- a) posicionar-se contra, e denunciar aos órgãos competentes, ações e procedimentos de membros da equipe de saúde, quando houver risco de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência ao paciente, visando a proteção da pessoa, família e coletividade.
- b) negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco a integridade física do profissional.
- c) negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.
- d) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereça segurança.
- e) anunciar a prestação de serviços para os quais detenha habilidades e competências técnico-científicas e legais.

05. De acordo com a Resolução COFEN 564/17, é correto o que se afirma em:

- a) O profissional de Enfermagem atua sob direção direta da coordenação médica e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico
- b) O cuidado da Enfermagem se fundamenta no conhecimento próprio da profissão e nas ciências biológicas e é executado pelos profissionais na prática social e cotidiana de assistir, gerenciar, ensinar, educar e pesquisar.
- c) os profissionais de Enfermagem têm direito a remuneração justa e a condições adequadas de trabalho, que possibilitem um cuidado profissional seguro e livre de danos.
- d) os profissionais de Enfermagem têm como direito a promoção e a restauração da saúde, a prevenção de agravos e doenças e o alívio do sofrimento; proporciona cuidados à pessoa, à família e à coletividade.
- e) é dever dos profissionais de Enfermagem participarem da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.

FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM

Breno Caldas

06. Sobre a verificação dos Sinais Vitais (SSVV) pelo Técnico de Enfermagem, é correto o que se afirma em:

- a) A verificação da temperatura por via axilar está indicada para ser mensurada, apenas, em lactentes e adultos.
- b) Ao verificar o pulso radial, percebe-se frequência, ritmo e amplitude do pulso.
- c) Ao verificar uma frequência respiratória, foi observado R= 10 mov/resp/min, que é classificado de taquipneia.
- d) Ao medir a Pressão Arterial, foi encontrado PA= 110x70, que é considerado hipertensão.
- e) Ao verificar a saturação de O₂ de um paciente na unidade de urgência, o Técnico de Enfermagem constatou que ele está com 50% de Sat O₂, logo, o paciente está com a saturação dentro dos limites aceitáveis para um paciente eupneico.

07. Sobre a aferição da pressão arterial (PA) o Técnico de Enfermagem deve atentar para algumas recomendações necessárias para se obter um valor fidedigno. Assinale a alternativa correta sobre os cuidados que devem ser realizados para a aferição da PA fidedigna.

- a) Posicionar o paciente sentado com o membro superior apoiado na altura do abdome, com as costas apoiadas no assento.
- b) Não oferecer ingestas de bebidas com cafeína por pelo menos 30 minutos antes da aferição.
- c) Realizar pelo menos quatro medidas em cada consulta, com intervalo de 20 minuto entre elas.
- d) O Técnico de Enfermagem deve oferecer anti-hipertensivo uma hora antes do procedimento.
- e) A verificação de PA deve ser evitada no último trimestre de gestação.

08. Os sinais vitais são descritos como medidas que fornecem dados fisiológicos, os quais indicam as condições de saúde do paciente.

Em relação à avaliação dos sinais vitais, assinale a alternativa incorreta.

- a) A artéria radial e a carótida são normalmente utilizadas para avaliação do pulso devido à facilidade de palpação.
- b) A convecção é a transferência de calor a partir da superfície de um objeto para a superfície de outro sem contato direto entre os dois.
- c) Na observação dos movimentos respiratórios, pode haver redução ou aumento da amplitude, ou seja, respiração leve ou intensa.
- d) A pressão arterial pode ser mensurada diretamente na artéria (não invasiva), com a utilização de um cateter inserido nela, ou indiretamente (invasiva), com a utilização do esfigmomanômetro e do estetoscópio.
- e) A idade não é um dos fatores que afetam a temperatura corporal.

09. O cuidado a pacientes com Diabetes Gestacional é um dos cotidianos laborais do Técnico de Enfermagem. Assinale a alternativa correta:

- a) O diabetes gestacional refere-se a qualquer grau de intolerância à glicose, com início após a gravidez.
- b) A Síndrome dos ovários policísticos não é um fator de risco para Diabetes gestacional.
- c) Uma pessoa que desenvolve Diabetes Gestacional não possui risco de desenvolver DM tipo 2 após o parto.
- d) A hiperglicemia desenvolve-se durante a gravidez, decorrente da secreção dos hormônios placentários que provocam resistência à insulina.
- e) A hiperglicemia durante a gestação não afeta os filhos dessas mulheres.

10. Analise as alternativas sobre os locais de verificação do pulso e assinale a correta.

- a) O uso do estetoscópio é essencial para a verificação de pulso poplíteo.
- b) Habitualmente, faz-se a verificação do pulso na veia radial.
- c) Quando o pulso radial se apresenta muito fraco, as artérias mais calibrosas, como a carótida e a pediosa, poderão facilitar a correta verificação.
- d) Outros pulsos como o temporal, o braquial, o cavitário e o anelar também podem ser verificados.
- e) A verificação de pulso carotídeo é indicada em pacientes adultos em parada cardiorrespiratória (PCR).

11. Todo curativo necessita de cuidados especiais e indicações adequadas. O filme transparente é um curativo estéril constituído por uma membrana de poliuretano, coberto com adesivo hipoalergênico e deve ser usado:

- a) em úlceras exsudativas infectadas, com odores acentuados e em fístulas e gangrenas.
- b) na prevenção de colonização e tratamento de queimadura.
- c) em úlceras cirúrgicas infectadas; fixação de cateteres e na prevenção de úlceras de pressão.
- d) nos desbridamentos intensos.
- e) na prevenção e tratamento de dermatites.

12. De acordo com o Ministério da Saúde (2012), a gravidade das queimaduras é determinada, principalmente, pela extensão da superfície corporal atingida e pela profundidade das lesões. Assinale a alternativa correta em relação à temática.

- a) A queimadura é de terceiro grau, quando destrói todas as camadas da pele, atingindo tecidos adjacentes e profundos, originando cicatrização hipertrófica por segunda intenção.
- b) A queimadura é de segundo grau, quando atinge apenas as camadas profundas.
- c) A queimadura é de segundo grau, quando atinge a derme, podendo ser superficial e profunda, atingindo vasos e terminações nervosas periféricas. Essa queimadura geralmente não causa dor.
- d) A queimadura é de primeiro grau, quando atinge a epiderme e a derme. Dependendo da extensão pode se tornar grave.
- e) A queimadura é de primeiro grau, quando atinge apenas a epiderme. É considerada de baixa gravidade mesmo quando atinge mais da metade do corpo.

13. Utilizando a regra dos nove, para o cálculo de superfície corporal queimada, calcule a superfície corporal afetada no paciente que apresenta queimaduras em face, pescoço e tronco posterior.

- a) 9%.
- b) 27%.
- c) 18%.
- d) 67%
- e) 36%

14. Utilizando a regra dos nove, para o cálculo de superfície corporal queimada, calcule a superfície corporal afetada no paciente que apresenta queimaduras em face, pescoço e tronco posterior e anterior.

- a) 18%.
- b) 36%
- c) 18%.
- d) 27%
- e) 45%.

15. Assinale uma condição que classifica a queimadura como grave, conforme o Ministério da Saúde.

- a) Idade menor do que 5 anos ou maior do que 60 anos.
- b) Ter o paciente sofrido queimadura sob o efeito de bebida alcoólica.
- c) Extensão/profundidade maior do que 10% de Superfície Corporal Queimada em adultos.
- d) Presença de lesão inalatória.
- e) Extensão/profundidade maior do que 5% de Superfície Corporal Queimada em crianças.

16. Diante de um atendimento às pessoas vítimas de queimaduras térmicas, assinale a alternativa correta.

- a) No politraumatizado grave, deve-se priorizar o atendimento ao trauma e os efeitos sistêmicos da queimadura e depois a queimadura.
- b) Expor a área queimada, retirando as roupas e objetos que estejam aderidos à pele, com o objetivo de diminuir a área exposta ao calor excessivo.
- c) Deve-se irrigar com soro fisiológico em abundância, objetivando o resfriamento da área queimada e, em seguida, cobrir com compressas secas, estéreis e não aderentes.
- d) Deve-se lavar a queimadura com uma solução de soro fisiológico com dipirona.
- e) Manter a permeabilidade das vias aérea e administrar oxigênio em baixo fluxo para não aumentar o trauma pulmonar.

17. Sobre os cuidados dispensados aos pacientes portadores do cateter urinário, assinale a alternativa correta:

- a) Quando ocorrer desconexão, cateter urinário, deve ser reconectado imediatamente.
- b) Manter sempre a bolsa coletora acima do nível da bexiga.
- c) É necessário fechar previamente o cateter antes da sua remoção.
- d) A passagem do cateter urinário para sondagem vesical de alívio requer técnica estéril.
- e) Manter o sistema de drenagem fechado e estéril.

18. Assinale a alternativa correta sobre Enfermagem em emergência.

- a) A hemorragia que resulta no aumento do volume sanguíneo circulante é uma das principais causas de choque.
- b) As lesões intra-abdominais podem ser categorizadas como lacerantes ou não lacerantes.
- c) Concentrados de hemácias são infundidos quando há perda sanguínea maciça.
- d) O choque séptico é uma condição na qual existe a perda do volume sanguíneo circulante efetivo.
- e) A maioria das mortes relacionadas com o calor é de crianças, tendo em vista que seus sistemas circulatórios não conseguem compensar o estresse imposto pelo calor.

19. O Carvão Ativado pode estar associado à prata. É composto de uma camada de tecido de carvão ativado impregnado com prata inserido em um envoltório de não tecido com borda selada em toda sua extensão. Sobre o carvão ativado, marque a alternativa correta.

- a) Feridas exsudativas moderadas a altas; feridas com ou sem sangramentos; áreas doadoras de enxerto; feridas cavitárias em geral; desbridamento de pequenas áreas de necrose de liquefação.
- b) Auxilia no desbridamento autolítico; promove hemostasia em lesões sangrantes.
- c) A saturação do tecido de carvão ativado acontece, em média, em 3 a 4 dias, podendo ficar no leito até 7 dias.
- d) Mantém o meio úmido; promove desbridamento autolítico; reduz o risco de infecção, pois atua como barreira térmica, microbiana e mecânica; reduz atrito.
- e) Forma uma camada protetora da pele; atua como barreira à contaminação da ferida; é impermeável a água e outros agentes; adapta-se aos contornos do corpo; permite visualização direta da ferida.

20. Sobre a classificação das lesões por pressão (LPP), marque a alternativa correta.

- a) Lesão por Pressão não-estadiável: Perda da pele em sua espessura total e perda tissular não visível.
- b) Lesão por Pressão não-estadiável: Descoloração vermelha escura, marrom ou púrpura, persistente e que não embranquece. Pele intacta ou não intacta com área localizada de vermelho escuro persistente não branqueável, descoloração marrom ou roxa ou separação da epiderme revelando um leito da ferida escuro ou com flictena de sangue.
- c) Lesão por Pressão Estágio 3: Perda total da espessura da pele e perda tissular.
- d) Lesão por Pressão Estágio 1: Perda de espessura parcial da pele com exposição da derme.
- e) Lesão por Pressão Estágio 2: Pele íntegra com eritema não branqueável, apresenta pele intacta com uma área localizada de eritema não branqueável, que pode parecer diferentemente em pele de pigmentação escura.

ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA

Lígia Carvalheiro

21. As doenças crônicas não transmissíveis tais como diabetes, hipertensão e outras possuem cunho preventivo de grande relevância, principalmente quanto às ações voltadas aos fatores de risco classificados como modificáveis. Diante disso, assinale a alternativa em que pelo menos um fator de risco não se encaixe na categoria “modificáveis” quando o tema é hipertensão.

- a) estresse e tabagismo
- b) idade e alimentação inadequada
- c) sedentarismo e ingestão elevada de sal
- d) consumo exacerbado de álcool e tabagismo
- e) hipercolesterolemia e estresse

22. A aferição da pressão arterial é comumente realizada pela equipe de enfermagem. De acordo com a Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020, a aferição em consultório deve ocorrer mediante a certificação de alguns fatores por parte do profissional, no intuito do valor não ser influenciado por fatores secundários. Assim, é IDEAL que, no momento da aferição, o paciente:

- a) esteja com a bexiga cheia
- b) tenha fumado há menos de 30 minutos.
- c) tenha recém ingerido bebidas alcoólicas e fumado
- d) tenha ingerido até 100 mL café nos últimos 10 minutos
- e) não tenha praticado exercícios nos últimos 60 minutos

23. De acordo com a medida da pressão arterial em consultório, segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020, assinale a alternativa correta:

- a) A PA deve ser medida em toda avaliação por médicos, de qualquer especialidade, e por todos os profissionais da saúde devidamente capacitados.
- b) Exclusivamente aos enfermeiros cabe o diagnóstico de HA e seus fenótipos, assim como a conduta relacionada a tais diagnósticos.
- c) Os esfigmomanômetros auscultatórios ou oscilométricos são os métodos preferidos para medir a PA. Esses dispositivos devem ser validados de acordo com as condições e os protocolos padronizados e sua calibração deve ser verificada bianualmente, pelo menos.
- d) A PA deve ser inicialmente medida no braço direito e, após, no esquerdo. Todas as medidas subsequentes devem ser realizadas no braço com valores mais elevados da PA.
- e) Em idosos, diabéticos, disautônômicos ou naqueles em uso de anti-hipertensivos, a PA também deve ser medida 1 minuto e 3 minutos após estar deitado (imóvel).

24. Os termos urgência e emergência hipertensiva surgiram como proposta para uma classificação operacional da crise hipertensiva. Acerca deste tema, assinale a alternativa correta:

- a) As urgências hipertensivas são situações clínicas assintomáticas em que há elevação acentuada da pressão arterial - (PAS) ≥ 160 e/ou diastólica (PAD) ≥ 120 mmHg - sem lesão aguda e progressiva em órgãos-alvo (LOA) e sem risco iminente de morte.
- b) As emergências hipertensivas (EH) são situações clínicas sintomáticas em que há elevação acentuada da PA (definida arbitrariamente como PAS ≥ 200 e/ou PAD ≥ 100 mmHg) sem LOA aguda e progressiva, sem risco iminente de morte.
- c) A pseudocrise hipertensiva não há LOA aguda ou risco imediato de morte. Geralmente, ocorre em hipertensos tratados e não controlados, ou em hipertensos não tratados, com medidas de PA muito elevadas, mas oligossintomáticos ou assintomáticos.
- d) Tendo em vista que a PA sistêmica é resultante do produto do débito cardíaco (DC) pela resistência vascular periférica (RVP), elevações agudas da PA podem resultar de alterações nessas variáveis. Assim, aumento do volume intravascular, da RVP, produção aumentada de vasodilatadores endógenos e/ou ativação de sistemas vasoconstritores podem precipitar maior vasorreatividade resultando em Crise hipertensiva.
- e) A Emergência hipertensiva é definida apenas pelo nível da PA, sem considerar o estado clínico do paciente.

25. J.M.B, 58 anos, diabético, foi até a Unidade de Saúde da Família para controlar a sua pressão arterial. Ela permaneceu em repouso cerca de 15 minutos antes da aferição e o valor obtido foi 165x105 mmHg. Ao verificar o prontuário do paciente, o enfermeiro notou que o último valor aferido, uma semana antes daquele momento, era de 170x100 mmHg. De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, qual a classificação de hipertensão que a paciente se encontra?

- a) 2
- b) 3
- c) 1
- d) Normal
- e) Pré hipertensão

26. Para cada exame ou cirurgia, é necessário que o posicionamento do paciente esteja coerente com o livre acesso à área de interesse. Desta forma, assinale a alternativa cujo posicionamento seja adequada à realização de cirurgias de coluna lombar.

- a) Posição de Fowler
- b) Decúbito lateral ou Sims
- c) Genupeitoral
- d) Decúbito ventral ou de prona
- e) Posição de Semi-fowler

27. O paciente M.J, 55 anos, entrou no hospital "X" pelo pronto atendimento, no entanto, após ultrassonografia de abdome, foi diagnosticado colecistite e, com isso, precisou ser submetido à cirurgia de colecistectomia. Quanto ao potencial de contaminação da cirurgia, pode-se classificá-la em:

- a) limpa
- b) suja
- c) contaminada
- d) potencialmente contaminada
- e) infectada

28. Diabetes mellitus é um transtorno metabólico resultante de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina com afecção no metabolismo dos carboidratos, proteínas e gorduras. Seus sinais e sintomas clássicos, incluem:

- a) Poliúria, polidipsia, perda de peso inexplicada, polifagia.
- b) Hematúria, ganho de peso, alterações degenerativas da cervical.
- c) Disúria, infecções repetitivas urinárias, alterações de paratireoide e uterinas.
- d) Disúria, aumento de peso inexplicado, otalgia e fístula retal.
- e) Hematúria, aumento de peso, polifagia e poliúria

29. No uso do Desfibrilador externo automático, na parada cardiorrespiratória, o equipamento que faz a leitura do ritmo cardíaco, somente indicará o disparo do choque nos ritmos ditos como "chocáveis". Qual das alternativas abaixo apresenta um ritmo chocável e um não chocável, respectivamente?

- a) Taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular
- b) Assistolia e Atividade Elétrica sem Pulso
- c) Atividade Elétrica sem Pulso e Taquicardia ventricular sem pulso
- d) Fibrilação ventricular e Assistolia
- e) Taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação atrial

30. Na escolha do curativo ideal, é necessário que vários itens sejam levados em consideração, além do custo. Tamanho da lesão, característica e quantidade do exsudato, disponibilidade, presença ou não de infecção e outros fatores são relevantes na escolha do dispositivo. São finalidades do curativo ideal:

- a) proteger traumas mecânicos
- b) desbridar área de granulação
- c) retardar a cicatrização
- d) manter alto nível de umidade na ferida
- e) absorver totalmente o exsudato da lesão

31. O enfermeiro, durante o exame físico de um paciente recém admitido, notou que a região sacral tinha uma lesão da derme superficial, com flictenas e abrasões. Referente à classificação dos Estágios de Lesão por Pressão trazidas pela NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel), a lesão verificada é estadiada como estágio:

- a) estágio 0
- b) estágio I
- c) estágio II
- d) estágio III
- e) estágio IV

32. Dentre as diversas tecnologias de coberturas de lesões, assinale a alternativa que apresenta informações totalmente corretas.

- a) O alginato de cálcio é indicado para o tratamento de feridas decorrentes de queimaduras.
- b) O carvão ativado é indicado para uso em feridas recobertas por tecido necrótico seco.
- c) A sulfadiazina de prata deve ser usada continuamente em queimaduras, independentemente do tempo, até que ocorra a cicatrização.
- d) O hidrocoloide é contraindicado a pacientes com feridas infectadas e com grande quantidade de exsudato.
- e) Coberturas não aderentes estéreis impregnadas com petrolato não são indicadas para áreas doadoras ou receptoras de enxerto.

33. Acerca da nomenclatura dos tempos cirúrgicos, o que se refere à aproximação das bordas dos tecidos seccionados ou ressecados, visando facilitar a cicatrização é chamado de:

- a) Exérese
- b) Hemostasia
- c) Diérese
- d) Aférese
- e) Síntese

34. A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é uma ferramenta para organizar o trabalho do enfermeiro. O processo de enfermagem é parte deste método e é regulamentado pela Resolução COFEN 358/08. Neste contexto, assinale a alternativa correta:

- a) O processo de enfermagem quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o Processo de Saúde de Enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como Triagem de Enfermagem.
- b) A SAE, apesar de se apresentar como método científico de trabalho da Enfermagem, não precisa ter como sustentação uma Teoria de Enfermagem.
- c) O processo de enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes, são elas: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem.
- d) O diagnóstico de enfermagem é um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem.
- e) A avaliação de enfermagem é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.

35. O hipotireoidismo é uma alteração da tireoide em que há diminuição da produção dos hormônios T3 e T4, que são essenciais para o bom funcionamento do corpo. São sinais e sintomas de hipotireoidismo:

- a) fadiga, unhas quebradiças, queda de cabelo, ganho de peso.
- b) palpitações, nervosismo, unhas quebradiças, ganho de peso e pele úmida.
- c) nervosismo, palpitações, perda de peso e pele úmida.
- d) fadiga, exoftalmia, ganho de peso e pele úmida.
- e) exoftalmia, palpitações, queda de cabelo e pele seca.


36. Acerca dos períodos transoperatórios descritos pelo Sistema de Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP) segundo Sociedade Brasileira de Enfermagem em Centro Cirúrgico – SOBECC (2017), assinale a alternativa correta:

- a) O período pré-operatório imediato é aquele que compreende as 24 horas que antecedem o procedimento anestésico-cirúrgico, estendendo-se até o encaminhamento do paciente ao Centro Cirúrgico, devendo o enfermeiro promover medidas físicas e emocionais que garantam maior segurança e conforto ao paciente.
- b) O período intra operatório compreende desde o momento em que o paciente é recebido na unidade de Centro Cirúrgico até sua saída da sala de operações, devendo o enfermeiro atentar-se para cuidados como instalação de oxímetro de pulso e uso da placa de bisturi de cautério.
- c) A recuperação pós-anestésica compreende as primeiras 24 horas após a intervenção anestésico-cirúrgica. A permanência na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) ou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), assim como a recuperação no domicílio, também se incorporam a esse período.
- d) O período pós-operatório imediato inicia-se após as primeiras 24 horas que se seguem à cirurgia e se estende até a alta do paciente ou mesmo após seu retorno ao domicílio. O enfermeiro deve avaliar a complexidade do procedimento anestésico-cirúrgico realizado e implementar o plano de cuidados para pacientes internados, até a sua alta.
- e) O período intra operatório compreende as 24 horas que antecedem o procedimento anestésico-cirúrgico, estendendo-se até o encaminhamento do paciente ao Centro Cirúrgico, devendo o médico, apenas, promover medidas físicas e emocionais que garantam maior segurança e conforto ao paciente.

37. Conhecer os termos técnicos é essencial para os registros dos profissionais, bem como comunicação adequada da equipe. Diante disso, a remoção de um mais ovários é corretamente chamada de:

- a) Histerectomia
- b) Ooforectomia
- c) Laparotomia
- d) Blefaroplastia
- e) Esplenectomia

38. Durante a palpação abdominal, o enfermeiro percorreu todos os quadrantes do paciente que relatava queixas difusas de cólicas e dificuldade de evacuar. Com relação à imagem abaixo, a área identificada como número 6 corresponde a:



- a) hipocôndrio esquerdo;
- b) epigástrica esquerda;
- c) fossa ilíaca esquerda;
- d) flanco esquerdo;
- e) hipogástrica esquerda.

39. Durante a execução do exame físico, são preconizadas etapas para uma avaliação organizada. Quanto à avaliação abdominal, a sequência correta corresponde a:

- a) Inspeção, palpação, percussão e ausculta.
- b) Inspeção, coleta de dados, verificação, pressão e avaliação.
- c) Verificação de temperatura, pulso, frequência cardíaca e pressão arterial.
- d) Peso, altura, temperatura, pressão arterial.
- e) Inspeção, ausculta, palpação, percussão.

40. A hepatite é uma inflamação do parênquima hepático causada por vírus, fármacos, álcool e outras drogas, além de doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. As principais características das hepatites A, B e C são:

- a) A hepatite B é de transmissão fecal-oral, geralmente assintomática e prevenível pela respectiva vacina e medidas de higiene e saneamento básico.
- b) A hepatite C é transmissível pelo sangue, mas principalmente pela prática sexual desprotegida. A vacina apropriada deve ser aplicada logo no nascimento, em 3 doses
- c) A hepatite C é transmissível por meio do compartilhamento de material para uso de drogas (seringas, agulhas, cachimbos, entre outros), higiene pessoal (lâminas de barbear e depilar, escovas de dente, alicates de unha ou outros objetos que furam ou cortam) ou para confecção de tatuagem e colocação de piercings; de mãe infectada para o filho durante a gravidez; sexo sem camisinha com uma pessoa infectada.
- d) A hepatite D é uma doença infecciosa viral, contagiosa, causada pelo vírus da hepatite delta ou HDV. Trata-se de um vírus RNA, que precisa do vírus C para que ocorra a infecção.
- e) O vírus da hepatite B é transmitido pela mesma forma do vírus da hepatite A.

ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA

Guilherme Gasparini

41. Você está de plantão na unidade de clínica médica quando é chamado pelo acompanhante do paciente para avalia-lo. Chegando ao quarto, o acompanhante relata que ele apresentou desmaio súbito e “não respondeu mais”. Suspeitando de uma PCR, qual o local e o respectivo tempo para avaliar a presença ou ausência de pulso no paciente?

- a) Radial, até 5 segundos
- b) Ulnar, até 10 segundos
- c) Radial, até 1 minuto
- d) Carotídeo, até 5 segundos
- e) Carotídeo, de 5 a 10 segundos.

42. Segundo a American Heart Association e o Ministério da Saúde, o que compõe uma Reanimação Cardiopulmonar de alta qualidade no adulto?

- a) Frequência de 100 a 120 compressões por minuto; Relação compressão e ventilação adequada; Retorno total do tórax; Profundidade de 5 a 6 cm; Desfibrilação precoce; Troca do socorrista a cada 2 minutos ou antes em caso de cansaço.
- b) Frequência de 80 a 100 compressões por minuto; Relação compressão e ventilação adequada; Retorno total do tórax; Profundidade de 5 a 6 cm; Desfibrilação precoce; Troca do socorrista a cada 2 minutos ou antes em caso de cansaço.
- c) Frequência de 80 a 100 compressões por minuto; Relação compressão e ventilação adequada; Retorno total do tórax; Profundidade de 4 a 5 cm; Desfibrilação precoce; Troca do socorrista a cada 2 minutos ou antes em caso de cansaço.
- d) Frequência de 100 a 120 compressões por minuto; Relação compressão e ventilação adequada; Retorno total do tórax; Profundidade de 5 a 6 cm; Desfibrilação precoce; Troca do socorrista a cada 5 minutos ou antes em caso de cansaço.
- e) Frequência de 100 a 120 compressões por minuto; Relação compressão e ventilação adequada; Apoiar-se sobre o tórax para evitar perda de tempo; Profundidade de 5 a 6 cm; Desfibrilação precoce; Troca do socorrista a cada 2 minutos ou antes em caso de cansaço.

43. Os Mnemônicos são muito utilizados na área da saúde, tanto para memorização do conteúdo, como para agilidade no atendimento à vítima. Ante o exposto, qual o mnemônico utilizado para no atendimento a uma vítima de Para Cardiorrespiratória e outra vítima de Queda da Própria Altura, respectivamente?

- a) XABCDE e CABD
- b) CABD e XABCDE
- c) SAMPLA e AVDI
- d) CABD e ABCDE
- e) Nenhuma das anteriores.

44. Acerca do atendimento de enfermagem no Suporte Básico de Vida e considerando o Protocolo Suporte Básico de Vida SAMU (2017), é desejável no atendimento à PCR em mulheres grávidas com mais de 20 semanas o procedimento:

- a) Deslocamento do útero para a direita quando em PCR
- b) Deslocamento do útero para a esquerda quando em PCR
- c) Posicionar a mulher em decúbito ventral e iniciar RCP
- d) Executar o mesmo protocolo para Adultos, sem deslocamento do útero
- e) Lateralização do corpo para a esquerda quando em PCR

45. Você está atendendo um paciente vítima de colisão frontal entre veículo e poste, após aplicação da Escala de Coma de Glasgow atualizada (ECG-P), verificou um total de 11 pontos. Neste caso, você classificaria este paciente como:

- a) Grave
- b) Gravíssimo
- c) Moderado
- d) Leve
- e) Sem gravidade

46. Considerando as cadeias de sobrevivência da *American Heart Association* (2020) referendada pelo Ministério da Saúde, qual o 1º elo da Cadeia de Sobrevivência Intra-hospitalar?

- a) Acionamento do Serviço Médico de Emergência
- b) Desfibrilação
- c) RCP de Alta Qualidade
- d) Recuperação
- e) Prevenção e Reconhecimento Precoce

47. Considerando as cadeias de sobrevivência da *American Heart Association* (2020) referendada pelo Ministério da Saúde, qual o 1º elo da Cadeia de Sobrevivência Extra-hospitalar?

- a) Desfibrilação
- b) Acionamento do Serviço Médico de Emergência
- c) Recuperação
- d) RCP de Alta Qualidade
- e) Prevenção e Reconhecimento Precoce

48. Você está atendendo um paciente vítima de colisão frontal entre veículo e poste e notou dificuldade da respiração. Neste caso, considerando o evento traumático, para a abertura de via aérea recomenda-se a técnica:

- a) Jaw Thrust
- b) Chin Lift
- c) Tração da mandíbula
- d) Intubação imediata
- e) Não há necessidade de técnica associada

49. A escala de Cincinatti avalia os seguintes parâmetros na suspeita de AVE:

- a) Frequência Cardíaca, debilidade dos braços e fala.
- b) Frequência Repsiratória, debilidade dos braços e fala.
- c) Fala, debilidades dos membros inferiores e deambulação.
- d) Debilidade dos braços, fala e força.
- e) Debilidade dos membros inferiores, deambulação e fala.

50. Durante a RCP em Pediatria, a primeira droga de escolha e sua dose administrada em crianças menores de 1 ano são, respectivamente:

- a) Epinefrina, 1 mg/kg.
- b) Epinefrina, 0,1 mg/kg.
- c) Epinefrina, 0,01 mg/kg.
- d) Amiodarona, 150 mg.
- e) Epinefrina, 0,5 mg/kg.

DIREITO CONSTITUCIONAL

Emerson Bruno

51. De acordo com a Constituição da República, os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares são os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Nesse sentido, são organizações organizadas com base no primado:

- a) da hierarquia e da concorrência.
- b) da disciplina e obediência.
- c) do militarismo e da hierarquia.
- c) da cidadania e da formação para o trabalho.
- d) da hierarquia e da disciplina.
- e) da proporcionalidade e do patriotismo.

52. Conforme disposto no art. 42 da CF88. Aos militares dos estados e do Distrito Federal, são vedadas:

- a) a sindicalização e a greve.
- b) apenas a sindicalização.
- c) apenas a greve.
- d) a sindicalização, a greve e acumulação remunerada de cargos públicos.
- e) se candidatar a mandatos eletivos.

53. De acordo com o art. 144 da CF 88, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são forças auxiliares e reservas:

- a) das Forças Armadas.
- b) da Polícia Rodoviária Federal.
- c) da Marinha.
- d) do Exército.
- e) da Aeronáutica.

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL

Fabio Ramos

54. O policial-militar que permanecer desaparecido por mais ----- será oficialmente considerado extraviado:

- a) 24 horas;
- b) 48 horas ;
- c) 8 dias;
- d) 10 dias;
- e) 30 dias.

55. O ato pelo qual o policial-militar agregado retorna ao respectivo Quadro tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competir na respectiva escala numérica, na primeira vaga que ocorrer:

- a) Aprestamento.
- b) Agregação.
- c) revogação.
- d) Reversão.
- e) Dotação.

ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL*Thaysa Vianna*

56. A consulta pré-concepcional constitui-se como um instrumento importante na melhoria dos índices de morbidade e mortalidade materna e infantil porque, nela,

- a) Previne a gravidez indesejada, o risco de infecções sexualmente transmissíveis e colabora para uma gestação no momento ideal para o casal.
- b) Orienta-se para a diminuição do intervalo entre as gestações, contribuindo para minimizar a frequência de bebês de baixo peso.
- c) Recomenda-se a realização do exame clínico das mamas (ECM) e do exame preventivo do câncer do colo do útero duas vezes ao ano, na faixa etária de risco (16 a 49 anos).
- d) Avalia-se a administração preventiva de ácido fólico no período pré-gestacional, durante 30 a 59 dias antes da concepção.
- e) Proporciona que o casal receba as vacinas preconizadas, por exemplo, Hepatite B, que é contraindicada para gestantes e puérperas.

57. De acordo com o CAB elaborado pelo Ministério da Saúde, o número adequado de consultas no pré-natal é igual ou superior a

- a) 8.
- b) 6.
- c) 10.
- d) 12.
- e) 15.

58. Considerando as atribuições dos serviços de atenção básica de referência à Atenção à Gestação de Alto Risco, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Realizar captação precoce da gestante de alto risco, com busca ativa das gestantes.
 - II. Permitir a presença de acompanhante de livre escolha da mulher em todo o período de trabalho de parto, parto e puerpério.
 - III. Realizar visitas domiciliares às gestantes de sua população adstrita.
 - IV. Implantar o acolhimento com classificação de risco (ACCR).
- a) As frases I, II, III e IV estão corretas
 - b) As frases I e III estão corretas
 - c) As frases II e IV estão corretas
 - d) As frases II, III e IV estão corretas
 - e) Apenas a frase II está correta

59. Um dos sinais de presunção de gravidez é, exceto:

- a) Positividade da fração beta do HCG
- b) Atraso menstrual
- c) Náuseas e vômitos
- d) Coloração violácea vulvar
- e) Tubérculos de Montgomery

60. O aleitamento materno exclusivo é preconizado até os 6 meses de vida, contudo, algumas situações maternas contraindicam a amamentação. Qual das alternativas é um exemplo de contraindicação absoluta para a amamentação:

- a) Citomegalovírus
- b) Sífilis
- c) Hepatite B.
- d) Tuberculose
- e) HTLV 1 e 2

61. Sobre os tipos de aleitamento, correlacione as alternativas abaixo:

I- Aleitamento Exclusivo

II- Misto

III- Complementado

IV- Predominante

() Quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos.

() Quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.

() Quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo. Nessa categoria a criança pode receber, além do leite materno, outro tipo de leite, mas este não é considerado alimento complementar.

() Quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite

a) I, II, III e IV.

b) IV, III, II e I.

c) I, IV, III e II.

d) II, IV, III e I.

e) III, II, IV e I.

62. Durante a primeira consulta de pré-natal, uma gestante informou que a data da última menstruação foi em 13/09/2023 e utilizando a Regra de Naegele, a data provável do parto é:

a) 20/07/2023

b) 20/06/2023

c) 22/06/2023

d) 20/05/2023

e) 24/06/2023

63. Segundo o Ministério da Saúde, a equipe de saúde deve permanecer atenta com relação aos sinais e sintomas suspeitos de câncer. Sobre esse assunto, um dos sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama e que indica necessidade de referência urgente para a confirmação diagnóstica é, EXCETO:

a) Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos.

b) Nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos, que persistem por mais de um ciclo menstrual.

c) Nódulo mamário de consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho, em mulheres adultas de qualquer idade.

d) Descarga papilar sanguinolenta unilateral.

e) Qualquer mudança na coloração da pele ao redor das mamas em mulheres acima de 25 anos.

64. Sobre reanimação neonatal, avalie as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) para as corretas e Falso (F) para as incorretas.

I- () A reanimação neonatal é o conjunto de procedimentos destinados à manutenção da circulação sanguínea rica em oxigênio e nutrientes, otimizando a perfusão cerebral, prevenindo ou atenuando lesão neurológica em outros órgãos após parada cardiorrespiratória.

II- () Para assegurar a permeabilidade das vias aéreas, deve-se manter o pescoço do RN em leve extensão, por meio de um coxim em região cervical e escapular, evitando sua hiperextensão ou flexão exagerada.

III- () Para avaliação do RN devem ser feitas três perguntas norteadoras: gestação a termo? Respirando ou chorando? Tônus muscular em flexão? Se a resposta for “sim” para todas as perguntas, o RN necessitará de manobras de reanimação.

- a) V - V - F.
- b) F- F- F.
- c) V - F - V.
- d) V- V- V
- e) F - V - F.

65. A desidratação é uma das principais causas de internações infantis. O nível de desidratação é tipicamente classificado como leve, moderado ou grave. Em relação à desidratação em crianças, são sinais e sintomas:

- a) Dor abdominal, vômitos, diarreia.
- b) Febre, tosse, falta de apetite.
- c) Boca seca, olhos fundos, diminuição da produção de urina.
- d) Taquicardia, sudorese, tremores.
- e) Pulso cheio, hipotensão, diurese diminuída.

SAÚDE PÚBLICA

Thaysa Vianna

66. É uma das vacinas que uma criança de 12 meses deve tomar:

- a) tetraviral (primeira dose);
- b) hepatite B (segunda dose);
- c) hepatite A (dose única)
- d) Tríplice viral (reforço);
- e) pentavalente (segunda dose).

67. A vacina Pneumocócica 10v é uma das vacinas que uma criança de 12 meses deve tomar, esta vacina é preparada a partir de polissacarídeos capsulares bacterianos purificados do *Streptococcus pneumoniae* (pneumococo), com 10 sorotipos de pneumococo (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F). Segundo o Ministério da Saúde, essa vacina é indicada como prevenção às crianças menores de 2 anos de idade contra quais patologias, EXCETO:

- a) Sepses.
- b) Meningite.
- c) Pneumonia.
- d) Bacteremia.
- e) Bronquiolite

68. Na assistência ao paciente, as ações de orientação sobre os fatores de risco para a hipertensão e rastreamento do câncer de mama correspondem, respectivamente, aos seguintes níveis de prevenção:

- a) primário e terciário;
- b) secundário e primário;
- c) terciário e quaternário;
- d) primário e secundário;
- e) secundário e terciário

69. Os profissionais de saúde devem observar a idade mínima para aplicação da vacina influenza, que é de:

- a) 6 meses;
- b) 9 meses;
- c) 4 meses;
- d) 18 meses;
- e) 8 meses.

70. Dentre as alternativas abaixo, qual delas corresponde a uma doença e/ou agravo de Notificação imediata?

- a) Hepatite B.
- b) Tuberculose.
- c) HIV/AIDS
- d) Tentativa de suicídio
- e) Sífilis congênita.

71. A vacina contra a Febre Amarela esta recomendada para todo Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde analise as afirmativas a seguir sobre essa vacina.

I. No caso de crianças, o esquema básico é feito a partir dos 2 anos de idade, mas em caso de viagem para região endêmica, recomenda-se a partir de quatro meses de vida;

II. A vacina febre amarela (atenuada) deve ser administrada por via subcutânea, de preferência na região deltóide, na face externa da parte superior do braço

III. A vacina está contraindicada para pessoas que vivem com HIV.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II
- b) Apenas a II
- c) II e III
- d) I e III
- e) Todas as alternativas estão certas.

72. Sobre essas vacinas contra a gripe, contra o sarampo e contra a febre amarela, assinale a afirmativa correta.

- a) A vacina da gripe, em crianças menores de 6 meses, deve ser administrada na dose de 0,25ml pela via subcutânea.
- b) A tríplice viral é contraindicada em gestantes.
- c) A vacina contra febre amarela não é contraindicada para em lactantes.
- d) A aplicação intradérmica da vacina contra a influenza é recomendada para indivíduos que apresentam discrasias sanguíneas.
- e) A vacina tríplice viral não pode administrada simultaneamente com outras vacinas do calendário vacinal.

73. Sobre as recomendações do Ministério da Saúde a respeito da vacina meningocócica C (conjugada), qual das alternativas abaixo está incorreta:

- a) Crianças que iniciaram o esquema primário após 5 (cinco) meses de idade, devem completá-lo até 12 meses, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses; administrar o reforço com intervalo mínimo de 60 dias após a última dose.
- b) Criança entre 12 meses e 4 anos 11 meses e 29 dias, com esquema completo de 2 doses, mas sem a dose de reforço, administrar o reforço.
- c) Criança entre 12 meses e 4 anos 11 meses e 29 dias, sem comprovação vacinal, administrar 1 única dose.
- d) Criança entre 12 meses e 4 anos 11 meses e 29 dias, com comprovação vacinal de 1 dose, administrar 1 dose de reforço.
- e) Criança entre 12 meses e 6 anos 11 meses e 29 dias, com comprovação vacinal de 1 dose, administrar 1 dose de reforço.

74. Sobre a administração de vacinas, é correto afirmar que:

- a) A vacina contra sarampo, caxumba e rubéola é contraindicada para idosos;
- b) A tríplice viral é indicada para grávidas a partir do segundo trimestre de gestação, devendo ser evitada no primeiro trimestre;
- c) O esquema básico da vacina contra o HPV para meninas é de 3 doses, na faixa etária entre 11 e 14 anos;
- d) A vacina dT adulto deve ser administrada em gestantes na dose de 0,5 ml e com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses;
- e) Idosos de 60 anos ou mais devem receber 2 doses da vacina pneumocócica 23.

75. De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, a vacina Covid-19 (RNAm) - PFIZER-COMINARTY (PEDIÁTRICA), após abertura do frasco e diluição, deve ser conservada em temperatura de 2° a 8° C e administrada em até:

- a) 2 horas;
- b) 4 horas;
- c) 6 horas;
- d) 8 horas;
- e) 12 horas

SAÚDE MENTAL

Thaysa Vianna

76. A respeito da internação psiquiátrica, é correto afirmar que a legislação prevê que as seguintes recomendações

- a) a internação involuntária é aquela determinada pela Justiça.
- b) a internação somente pode ser realizada mediante pedido de médico psiquiatra ou de psicólogo.
- c) o término da internação compulsória dar-se-á por solicitação escrita do familiar, do responsável legal ou do especialista responsável pelo tratamento.
- d) o término da internação voluntária dar-se-á por solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico assistente.
- e) o término da internação voluntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar ou do médico assistente.

77. O lítio (Li) é um dos medicamentos mais eficazes para o tratamento do transtorno bipolar. Particularmente útil para o tratamento de episódios maníacos agudos, ele reduz as taxas de suicídio associadas a transtornos afetivos. Porém, este medicamento pode causar toxicidade aguda leve, que causa os seguintes sinais e sintomas, exceto:

- a) tremor fino,
- b) apatia,
- c) fadiga,
- d) fraqueza muscular,
- e) hiporeflexia

78. O tratamento de emergência psiquiátrica focaliza as consequências da tentativa de suicídio e prevenção da autolesão adicional. Um paciente que faz gesto suicida pode fazê-lo novamente. Qual das alternativas abaixo não é empregada como uma intervenção em crise:

- a) Determinar o potencial suicida.
- b) Descobrir as áreas de depressão e conflito.
- c) Descobrir sobre o sistema de apoio do paciente
- d) Determinar se a hospitalização ou referência psiquiátrica é necessária
- e) Desacreditar que o paciente seria capaz de cometer o suicídio.

79. Na fase inicial o indivíduo se recupera do estado confusional, no entanto muitos terão distúrbios da memória que é característica da síndrome de Korsakoff. Esta síndrome se deve ao aparecimento de lesões cerebrais na área da memória que pode chegar à amnésia total. Sabe-se que a síndrome de Wernicke tem como causa a deficiência de:

- a) Vitamina B1
- b) Vitamina B12
- c) Vitamina D
- d) Vitamina C
- e) Vitamina A

80. O profissional de saúde deve ter como finalidade a redução de danos, nesse sentido, para usuários de álcool e as principais estratégias utilizadas devem ser:

- a) eliminação do uso de drogas por pessoas em situação de rua.
- b) repressão ao tráfico ilícito de drogas nas metrópoles
- c) imposição de normas prescritivas para o comportamento do usuário de drogas ilícitas.
- d) redução das consequências adversas do uso indevido de drogas.
- e) estímulo ao uso de drogas na população vulnerável.

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas>

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<https://bit.ly/Sistemas-de-Questões>
