

60

Uma mulher de 55 anos foi admitida na clínica médica de um hospital com um quadro grave de crise hipertensiva já estabilizado, mas ainda em uso de medicações venosas. Ao exame físico, o enfermeiro identifica a presença de uma fistula arteriovenosa no membro superior direito com frêmito tátil para as sessões de hemodiálise e a necessidade de um novo acesso venoso periférico.

Em relação ao atendimento a essa paciente, é correto afirmar que

- (A) o enfermeiro deve realizar a punção venosa para a administração das medicações anti-hipertensivas no membro superior direito, já que essa prática não afeta o acesso para hemodiálise.
- (B) o enfermeiro deve ter cautela com os acessos periféricos no membro superior direito, que apresenta a fistula arteriovenosa, mas devido à necessidade de controle rigoroso da pressão arterial, a medição deve ser alternada entre os membros superiores.
- (C) o enfermeiro deve realizar a punção venosa na própria fistula para não sobrecarregar a rede venosa da paciente.
- (D) o membro superior direito pode ser utilizado para a punção venosa, desde que a veia escolhida seja próxima da fistula arteriovenosa.
- (E) o enfermeiro deve evitar a punção venosa e a medição da pressão arterial no membro com a fistula arteriovenosa, preferindo realizar esses procedimentos no membro superior esquerdo.

46

A Rede Alyne foi instituída pela Portaria GM/MS nº 5.350 e Portaria GM/MS nº 5.359, de 12 de setembro de 2024, e é uma iniciativa do Governo Federal para atualizar e reestruturar a Rede Cegonha.

A Enfermagem tem um vasto campo de atuação no cuidado integral voltado às gestantes, parturientes, puérperas e crianças, com ações diretas e indiretas que abrangem consultas, cuidados técnicos e educativos, gestão, entre outros. Nesse sentido, conhecer a Rede Alyne é de suma importância para uma atenção qualificada ao público-alvo dessa rede.

Em relação ao tema, as seguintes afirmativas estão corretas, à exceção de uma. Assinale-a:

- (A) A Rede Alyne promove um modelo de cuidado humanizado e integral para a saúde da gestante, parturiente, puérpera e da criança e objetiva a redução da morbimortalidade materna e infantil, com ênfase no componente neonatal, sobretudo da população negra e indígena.
- (B) No componente pré-natal que se desenvolve na Atenção Primária à Saúde (APS), a promoção da saúde inclui a saúde sexual e o planejamento reprodutivo, ações que devem constar da consulta de enfermagem.
- (C) A Rede Alyne manteve os exames contemplados na Rede Cegonha e acrescentou o teste para HTLV, que é um teste rápido para hepatite B e o teste rápido para hepatite C.
- (D) O foco da Rede Alyne é a gestação de baixo risco, não incluindo em seus componentes ambulatoriais de gestação e puerpério de alto risco.
- (E) Fazem parte das ações no modelo de cuidado da Rede Alyne garantir a segurança alimentar e nutricional no início da vida com a oferta de leite humano nas unidades neonatais e garantir ambulatorio de seguimento de recém-nascidos e de crianças egressas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

47

Durante as etapas do período periooperatório, o enfermeiro desempenha papéis específicos para garantir a segurança e o bem-estar do paciente.

Assinale a opção que descreve corretamente uma ação correspondente ao período transoperatório.

- (A) Orientar o paciente e sua família sobre os cuidados necessários no domicílio após a alta hospitalar. Pós
- (B) Verificar se o paciente realizou o jejum pré-operatório conforme recomendado.
- (C) Monitorar continuamente os sinais vitais e manter a segurança do paciente durante o procedimento cirúrgico.
- (D) Avaliar a dor e administrar analgésicos no período imediato após o procedimento. Pós
- (E) Revisar exames pré-operatórios e obter o consentimento informado. Pré

42

A Resolução Cofen nº 710/2022 atualiza a norma técnica referente à atuação da equipe de enfermagem no processo de doação, captação e transplante de órgãos, tecidos e células.

Sobre essa atuação, avalie as afirmativas a seguir.

- I. ☒ Compete privativamente ao enfermeiro planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar as ações do técnico de enfermagem, prestadas ao doador vivo ou falecido, a seus familiares e ao receptor, bem como ao material biológico para fins de transplante.
- II. A entrevista familiar, com a finalidade de doação de órgãos, tecidos e células, compete à equipe de enfermagem, podendo ser realizada pelo técnico de enfermagem ou enfermeiro.
- III. ☒ A assistência de enfermagem no processo de doação, captação e transplante de órgãos, tecidos e células deve seguir protocolos institucionais baseados em evidências científicas, conforme legislação vigente.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- ☒ (C) I e III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, II e III.

43

Um paciente de 48 anos com doença renal crônica (DRC) estágio 4, está internado para o acompanhamento da progressão da doença. Durante a avaliação de enfermagem, ele relata fraqueza, náuseas frequentes e apresenta edema moderado em membros inferiores. Seus exames laboratoriais revelam Hb (hemoglobina) de 8,5 g/dL e fósforo sérico (P) de 6,8 mg/dL.

A conduta correta a ser tomada pelo enfermeiro é

- (A) verificar com o médico a necessidade de suspender a administração de eritropoetina devido ao risco de aumento da fraqueza muscular.
- (B) incentivar a ingestão de alimentos ricos em fósforo para corrigir os níveis de anemia.
- (C) aumentar a ingestão de líquidos para diluir o fósforo sérico elevado e reduzir os efeitos da hiperfosfatemia.
- ☒ (D) solicitar exames de sangue para avaliar marcadores inflamatórios.
- (E) orientar sobre restrição de alimentos ricos em fósforo e administrar quelantes de fósforo conforme prescrição médica.

?

44

O Centro de Atendimento Especializado em Transtornos do Espectro do Autismo (CEATEA) é uma referência para o diagnóstico e tratamento de pessoas com TEA. Sobre esse tema, avalie as afirmativas a seguir.

Sobre esse tema, avalie as afirmativas a seguir.

- () Um Projeto Terapêutico Singular (PTS) deve considerar a autonomia e a independência da pessoa com TEA.
- ☒ Entre as técnicas de intervenção que podem ser utilizadas com pessoas com TEA, a modelagem é uma das mais utilizadas.
- () No caso de pessoas com TEA, a avaliação deve considerar a família, sem a necessidade de construção de um plano de intervenção.
- () No caso de pessoas com TEA, a avaliação deve incluir a orientação sobre a escolha de medicamentos.

As afirmativas são

- (A) V - V - V - F
- ☒ (B) V - V - F - V
- (C) F - F - V - V
- (D) V - F - F - V
- (E) F - V - V - F

53

A RDC nº 222, de 28 de março de 2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), pretende minimizar os riscos inerentes ao gerenciamento de resíduos no país no que diz respeito à saúde humana e animal, bem como à proteção ao meio ambiente e aos recursos naturais renováveis.

Tendo por base essa RDC, assinale a afirmativa correta sobre o gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS).

- (A) Os sacos para o acondicionamento de RSS do grupo A devem ser substituídos ao atingirem o limite de 2/3 de sua capacidade ou então a cada 48 horas, independentemente do volume, visando ao conforto ambiental e à segurança dos usuários e profissionais.
- (B) O esvaziamento ou reaproveitamento dos sacos podem ser feitos quando não houver sacos suficientes na instituição.
- (C) Os sacos contendo RSS do grupo A de fácil putrefação devem ser substituídos no máximo a cada 48 horas, independentemente do volume.
- (D) Os RSS do grupo A que não precisam ser obrigatoriamente tratados e os RSS após o tratamento são considerados rejeitos e devem ser acondicionados em saco preto.
- (E) Os RSS do grupo A que obrigatoriamente precisam ser tratados devem ser acondicionados em sacos pretos.

54

Durante a ausculta cardíaca de um paciente, o enfermeiro posiciona o estetoscópio no quinto espaço intercostal, na linha médio-clavicular esquerda.

A válvula cardíaca que está sendo avaliada nesse local é

- (A) o foco de Erb (ou Terceiro Foco).
- (B) a pulmonar.
- (C) a tricúspide.
- (D) a aórtica.
- (E) a mitral.

55

Sobre os objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido pela Lei Orgânica de Saúde (LOS), avalie as afirmativas a seguir.

- I. Compete ao SUS a fiscalização e a inspeção de alimentos para consumo humano, exceto o de água e bebidas, pois esta fiscalização é de responsabilidade de outro sistema.
- II. Entre os objetivos do SUS está a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- III. O campo de atuação do SUS inclui a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador, de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, e de saúde bucal.
- IV. Compete ao SUS a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.

Estão corretas apenas as afirmativas

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II, III e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) I, III e IV.

56

Do conjunto de ações de vigilância sanitária, monitoram a saúde da população. A influenza respiratória

A respeito da

- I. Entre os sintomas, a mialgia.
- II. Pelo risco de transmissão, a trivalent é indicada para uso a cada cinco anos.
- III. No contexto da gripe sazonal, a gripe A é a referida, com início dos sintomas em 1 a 2 dias.
- IV. No caso de surto, as medidas de controle devem ser feitas com urgência.

Estão corretas

- (A) I, II e IV.
- (B) II e IV.
- (C) I, II e III.
- (D) I, III e IV.
- (E) I e II.

57

Atualmente, cada ano há cerca de 100 milhões de casos de doenças de células que afetam o sistema de acordo com o Ministério da Saúde. O câncer: cirurgias, quimioterapia, radioterapia, usadas em conjunto com a suscetibilidade das células às terapias e à prevenção.

Sobre esses tratamentos, assinale a afirmativa correta.

- I. A radioterapia é um procedimento de tratamento que utiliza radiação ionizante para destruir células cancerígenas.
- II. A quimioterapia é um tratamento que utiliza medicamentos para destruir células cancerígenas.
- III. Uma das indicações da quimioterapia é a prevenção de recidivas em pacientes com câncer.
- IV. Radioterapia (profilática): segrega radiação ionizante com a finalidade de prevenir o surgimento de novos tumores.

As afirmativas corretas são

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) III e IV, apenas.

Alterações no clima do planeta têm sido um tema preocupante e vêm ocupando as agendas dos líderes mundiais e de vários segmentos sociais. Esses eventos ameaçam a vida e geram múltiplos problemas, mobilizando debates para a proposição de políticas e programas, em especial na saúde pública. Grandes enchentes e ondas de calor são consequências atribuídas às alterações climáticas. Nessas situações, problemas de saúde física e mental são pontos de atenção dos governantes e dos profissionais de saúde.

Para o caso de eventos que envolvam alterações climáticas, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- (F) A leptospirose é uma doença infecciosa preocupante, pois a lama de enchentes tem alto poder infectante. A transmissão se dá por meio da exposição à urina de animais infectados quando a pessoa possui lesões na pele. Com a pele íntegra não há risco de infecção.
- (V) Para evitar o tétano acidental, a pessoa deve acessar os lugares acometidos por enchentes usando botas e luvas. Em caso de ferimento durante ou após uma enchente, deve-se verificar a data da última dose da vacina e, se for necessário, procurar o serviço de saúde/profissional de saúde para avaliar a necessidade de reforço.
- (V) Ondas de calor são eventos cada vez mais frequentes e a intensa exposição ao sol pode causar problemas de variados graus de gravidade. Uma pessoa com transpiração, fraqueza, tonturas, desmaios, náuseas, dor de cabeça, câibras musculares e diarreias pode estar sofrendo de exaustão térmica. No caso de insolação, entre às medidas de primeiros socorros estão a aplicação de compressas de água fria na testa, pescoço, axilas e virilhas e, se possível, deve-se borrifar delicadamente água fria em todo o corpo da pessoa.
- (V) No atendimento na unidade de saúde de um paciente de 25 anos, sexo masculino, que enfrentou uma enchente em casa e apresenta doença diarreica aguda, deve-se fazer a avaliação do estado de hidratação do paciente. Constatada a desidratação, deve-se administrar continuamente a solução de sais de reidratação oral, até que desapareçam os sinais de desidratação. No plano de educação em saúde devem constar as medidas de higiene pessoal, domiciliar e dos alimentos.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F - V - F - V.
- (B) V - F - V - F.
- (C) F - V - F - F.
- (D) F - V - V - V.
- (E) V - F - F - V.

40

A adoção de precauções padrão e precauções específicas por forma de transmissão é fundamental para a prevenção e o controle de infecções no ambiente hospitalar.

Considerando as recomendações para a segurança individual e coletiva dos profissionais de saúde e pacientes, assinale a afirmativa correta.

- (A) O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é opcional para os procedimentos invasivos quando o profissional de saúde já possui imunidade adquirida contra infecções comuns no ambiente hospitalar.
- (B) O isolamento de pacientes com infecções transmitidas por gotículas requer a utilização de máscara cirúrgica por profissionais de saúde e visitantes que entram no quarto.
- (C) As precauções padrão devem ser aplicadas somente em pacientes diagnosticados com doenças infecciosas confirmadas.
- (D) A desinfecção de superfícies e equipamentos médicos é necessária apenas quando há evidências visíveis de contaminação por fluidos biológicos.
- (E) A precaução de contato exige o uso obrigatório de máscara N95 para todos os profissionais.

41

Há métodos diagnósticos que devem ser feitos no período da consulta para possibilitar decisões rápidas e seguras que conduzam à feitura de um plano terapêutico e de cuidados adequados à situação clínica do usuário.

No atendimento de enfermagem, a enfermeira se deparou com a seguinte situação: F.L.Z., 35 anos, sexo masculino, solteiro, bissexual. Relatou ter mantido relação sexual casual com outro homem, de forma desprotegida, há pouco mais de 48 horas. Compareceu ao serviço de saúde para solicitar a PEP (Profilaxia Pós-Exposição), pois conhece várias pessoas que a usam para reduzir o risco de se infectar com alguma IST (Infecção Sexualmente Transmissível) e/ou com o vírus da Aids. No âmbito da consulta, a enfermeira forneceu algumas explicações para dar ampla ciência sobre seu caso e sobre o atendimento.

Com base nesse histórico e no tema tratado, avalie as afirmativas a seguir.

- I. Ainda que esteja disponível, no caso de F.L.Z. não está indicado o uso de PEP, pois este tipo de profilaxia deve ser instituído em até 48 horas após a exposição.
- ✓ II. A decisão pelo uso da PEP dependerá do status sorológico para HIV, a ser avaliado por meio de testes rápidos (TRs).
- ✓ III. Para uma pessoa com a história de F.L.Z., que compareça à unidade de saúde dentro da janela de tempo prevista no protocolo do Ministério da Saúde (MS) e cujo teste rápido não reagente para o HIV no momento do atendimento, a PEP está indicada.
- IV. Pelo histórico apresentado e pelo fato de a relação sexual ter sido casual, o tipo de profilaxia indicada é a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) a ser aplicada por sete dias consecutivos, a contar do dia da consulta.

As afirmativas a serem consideradas no atendimento do usuário F.L.Z. são

- (A) I, II e IV.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

35

O processo de enfermagem é um método que orienta o pensamento crítico e o julgamento clínico do enfermeiro direcionando a equipe de enfermagem para o cuidado.

De acordo com a Resolução Cofen nº 736/2024, o objetivo da etapa de evolução de enfermagem é:

- (A) avaliar os resultados alcançados de enfermagem e saúde, permitindo a análise e revisão de todo o processo de enfermagem.
- (B) registrar as condições iniciais de saúde do paciente, permitindo a análise e revisão de todo o processo de enfermagem.
- (C) formular os diagnósticos de enfermagem, permitindo a análise e revisão de todo o processo de enfermagem.
- (D) implementar as intervenções de enfermagem, permitindo a análise e revisão de todo o processo de enfermagem.
- (E) realizar o registro no prontuário do paciente, permitindo a análise e revisão de todo o processo de enfermagem.

36

Em uma unidade de emergência o enfermeiro de plantão atende um paciente de 58 anos, sexo masculino, com queixa de dor torácica que irradia para o membro superior esquerdo, apresentando pele fria, pálida e úmida, frequência cardíaca e frequência respiratória aumentadas, quando comparadas ao padrão normal para a faixa etária.

Sobre esse atendimento, avalie as afirmativas a seguir.

- I. No exame físico o enfermeiro deve avaliar o nível de consciência, as bulhas cardíacas, a pressão arterial, os pulsos periféricos, auscultar os campos pulmonares, avaliar a motilidade intestinal, observar o débito urinário e verificar a existência de edema.
- II. O enfermeiro deve coletar dados iniciais sobre o estado atual do paciente e compará-los com a evolução do quadro clínico. Isso inclui investigar a história de dor ou desconforto torácico, dispneia, palpitações, fadiga incomum, síncope ou outros sinais que possam indicar isquemia miocárdica.
- III. O enfermeiro deve realizar um exame mais focado em sinais e sintomas relacionados às doenças do aparelho respiratório, como a asma, e solicitar ao médico prescrição de broncodilatadores para melhorar a dor torácica e os sinais vitais alterados.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I e III.
- (B) II e III.
- (C) III.
- (D) I.
- (E) I e II.

37

Alterações na clima do planeta vêm ocupando as agendas de segmentos sociais. Esses múltiplos problemas, mobilizações políticas e programas, em alterações climáticas. Nessas e mental são pontos de profissionais de saúde. Para o caso de eventos que as afirmativas a seguir e sua

- (A) A leptospirose é uma zoonose de importância pública que se dá por meio da ingestão de água contaminada quando a pessoa pode estar em risco de infecção.
- (B) Para evitar o tétano, os ferimentos devem ser imediatamente lavados com água e sabão e, se necessário, receber o tratamento adequado.
- (C) Ondas de calor são períodos de intensa exposição solar, com altos graus de gravidade, podendo causar desidratação, tonturas, desmaios, dores musculares e cefaleia.
- (D) No atendimento a idosos, é importante avaliar a necessidade de medidas de prevenção de quedas, como o uso de bengala e tapetes antiderrapantes.

As afirmativas são:

- (A) F - V - F - V.
- (B) V - F - V - F.
- (C) F - V - F - F.
- (D) F - V - V - V.
- (E) V - F - F - V.

32

A saúde é um conceito complexo que envolve diferentes dimensões que se inter-relacionam: biológicas, psicológicas e sociais. A promoção da saúde integral abrange a compreensão do funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e o domínio sobre os transtornos e cuidados voltados à saúde mental. Sobre o atendimento e o cuidado com as pessoas em relação à saúde mental, avalie os procedimentos a seguir.

- I. De acordo com o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas do Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I (TAB), do Ministério da Saúde (2016), o TAB é um transtorno de humor e é uma doença crônica que compromete a qualidade de vida do paciente. Entre as intervenções psicossociais que fazem parte da reabilitação do paciente, o enfermeiro deve incluir no atendimento: a discussão dos sinais precoces de recaída, as medidas a serem tomadas nessa situação e o ensino de técnicas de controle do estresse.
- II. Um paciente com Transtorno Esquizoafetivo está em tratamento medicamentoso com Risperidona, em doses de 3 mg, duas vezes ao dia. O frasco disponível na farmácia tem 30 mL com 1 mg/mL. Para o período de 30 dias, a enfermeira explicou ao paciente que ele precisará de seis frascos.
- III. No atendimento ao paciente em sofrimento psíquico e a seu familiar, a enfermeira aplicou a Teoria das Relações Interpessoais de Hildegard Peplau, em suas quatro fases. Na segunda fase, que trata da identificação, ela selecionou a assistência profissional aplicada ao caso.
- IV. De acordo com o Instrutivo Técnico da RAPS do SUS (2022), os leitos em hospitais especializados em psiquiatria (hospitais psiquiátricos) devem atender a crises e agudizações, em internações de curta permanência (inferior a 90 dias), excluindo-se as situações de urgência/emergência relativas ao consumo ou abstinência de álcool, crack e outras drogas, pois para tais situações os pacientes devem ser encaminhados para os leitos de Unidades de Referência Especializada em Hospital Geral.

Os procedimentos corretos são apenas

- (A) ~~I, II e IV.~~ x
 (B) ~~II e III.~~ x
 (C) I, II e III.
 (D) ~~I e IV.~~
 (E) ~~I, II e IV.~~

33

As infecções centrais desfavorecem

Nos Estados Unidos, essa síndrome representa 25% em

Considerando a prevenção

(2017), sobre o cateter per

(A) a aspiração de infusão previne

(B) o fluxo contínuo de resíduo

(C) o uso de catete

(D) solução adequada e aces

(E) seringas maiores catete

34

Auditoria da assistência anotações do prontuário planejadas à prestação de indivíduos Sobre os

(A) Auditoria instit

a re

(B) Auditoria se u obti para

(C) Auditoria inst foi

(D) Auditoria inst a re de

(E) Auditoria au exi op

38

Um idoso de 78 anos chega à unidade básica de saúde acompanhado por sua filha, que relata que o pai apresenta perda de interesse por atividades e dificuldade em realizar tarefas simples do dia a dia. Durante a consulta, o enfermeiro identifica que o paciente apresenta lentidão ao caminhar e sinais de perda de peso recente.

A ação prioritária na avaliação inicial do enfermeiro, considerando as síndromes geriátricas, é iniciar com a:

- (A) identificação de sinais de desnutrição e realizar uma avaliação nutricional completa.
- (B) investigação de sinais de depressão utilizando um instrumento de rastreio validado.
- (C) avaliação de sinais de comprometimento cognitivo para investigar demência.
- (D) realização de triagem para síndrome da fragilidade.
- (E) avaliação do risco de quedas utilizando uma escala apropriada.

39

O aleitamento materno é uma estratégia eficaz para a redução da morbimortalidade infantil. No atendimento do binômio mãe-bebê, o enfermeiro assume um papel importante, com protagonismo e autonomia na consulta ao realizar o processo de enfermagem e dar enfoque ao aleitamento.

Sobre a consulta de enfermagem à mulher em fase de amamentação, avalie se as seguintes orientações devem constar do plano de cuidados:

- I. não há comprovação de que alguma comida ou bebida que a mãe ingira possa causar cólicas no bebê;
- II. o descanso influencia na produção de leite da mulher;
- III. caso o bebê não consiga sugar a mama, o enfermeiro deve ensinar à mãe a técnica de retirada do leite do peito com as mãos ou com uma bomba, para oferecer ao bebê na colher;
- IV. a chupeta pode ser utilizada porque não influencia na tendência da criança em mamar por mais ou menos tempo.

Estão corretas as orientações

- (A) I, II e III.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e II, apenas.

40

A adoção de p
forma de tran
controle de infe
Considerando a
coletiva dos p
afirmativa corre

- (A) O uso de
opcional p
profissional
infecções co
- (B) O isolamen
gotículas n
profissional
- (C) As precau
pacientes
confirmadas
- (D) A desinfecç
necessária
contaminaç
- (E) A precauçã
N95 para to

41

Há métodos di
consulta para
conduzam a fe
adequados a sit
No atendiment
seguinte situa
bissexual. Rela
homem, de fi
Compareceu a
Pós-Exposição
reduzir o ri
Sexualmente
da consulta,
ampla ciência
Com base ne
a seguir.

- I. Ainda qu
o uso de
até 48 h
- ✓ II. A decisã
HIV, a s
- ✓ III. Para ur
unidade
protocolo
não re
está in
- IV. Pelo h
sido c
Prê-E
conta

As afirma
F.L.Z. são
(A) I, II e
(B) I e IV
(C) II e I

48

As recomendações para Suporte Básico de Vida (SBV) e para Suporte Avançado de Vida Cardiovascular (SAVC) estão combinadas nas diretrizes da American Heart Association (AHA) publicadas em 2020.

Sobre as principais novas alterações de SBV e SAVC em adultos, avalie as afirmativas a seguir.

- I. O atendimento do paciente após o retorno da circulação espontânea requer muita atenção à oxigenação, ao controle da pressão arterial, à avaliação da intervenção coronária percutânea, ao controle direcionado de temperatura e ao neuroprognóstico multimodal. ✓
- II. O acesso intraósseo é a via de primeira escolha de administração de medicação durante a ressuscitação no SAVC. ✓
- III. Mensurar continuamente a pressão arterial sanguínea e o teor de dióxido de carbono ao final da expiração durante a ressuscitação de SAVC pode ser útil para melhorar a qualidade da reanimação cardiopulmonar.
- IV. As recomendações anteriores da AHA sobre a administração de epinefrina foram reafirmadas, com ênfase em sua administração mais precoce.

As afirmativas corretas são

- (A) I, II e III, apenas.
 (B) I, III e IV, apenas.
 (C) II, III e IV, apenas.
 (D) I, II e IV, apenas.
 (E) I, II, III e IV.

49

Um dos recursos de proteção contra infecções é a imunização por meio de vacinas. No Brasil, o Ministério da Saúde disponibiliza uma ampla cartela de imunizantes pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). Ao receber as pessoas na sala de vacina, o profissional precisa estar atento ao calendário e à caderneta e/ou ao cartão de vacinação do usuário, para que possa avaliar corretamente quais vacinas e doses devem ser administradas.

Nesse sentido, na avaliação da administração da vacina rotavírus humano G1P [8] (atenuada) – VRH, para uma criança com quatro meses de idade, é correto afirmar que

- (A) essa criança pode tomar a 2ª dose da vacina, pois na avaliação da caderneta verificou-se que ela tomou a 1ª dose aos dois meses de idade. ✓
- (B) se, na administração da 2ª dose, a criança cuspir, será necessário reaplicar a dose.
- (C) essa vacina é a única que pode ser administrada diante de quadro agudo de gastroenterite, pois ela atua para a resolução desse tipo de quadro.
- (D) essa vacina só pode ser administrada a partir dos seis meses de idade.
- (E) essa vacina não faz parte do calendário, sendo administrada apenas quando há surtos.

50

O traumatismo cranioencefálico varia desde uma concussão leve até uma lesão mais grave e conhecida como lesão traumática grave. As causas mais comuns de LCT são quedas, acidentes com veículos motorizados, a colisão de veículos.

Sobre a assistência do enfermeiro ao paciente com traumatismo cranioencefálico, é correto afirmar

- (A) uma leitura da Escala de Coma de Glasgow é considerada como indicativa de lesão grave, sendo recomendada a administração de oxigênio. ✓
- (B) a Escala de Coma de RASS se baseia na abertura dos olhos, respostas verbais e respostas motoras.
- (C) a Escala de Coma de Ramsay avalia a consciência do paciente, a abertura dos olhos, a resposta motora e a resposta verbal.
- (D) na Escala de Coma de Glasgow, um paciente com um escore de 3 é considerado com lesão grave, enquanto um escore de 15 é considerado com lesão leve.
- (E) na Escala de Coma de RASS, um paciente com um escore de 3 é considerado com lesão grave, enquanto um escore de 15 é considerado com lesão leve.

51

O processo de enfermagem é uma abordagem deliberada e sistemática em que ocorre o cuidado de enfermagem.

De acordo com a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 564/2017, os elementos considerados para o planejamento de enfermagem são

- I. priorização de diagnósticos de enfermagem.
- II. determinação de intervenções de enfermagem e de suas prioridades.
- III. tomada de decisão terapêutica e de enfermagem das intervenções assistenciais. ✓

IV. priorização da prescrição de enfermagem.

- Estão corretos os itens
- (A) II, III e IV, apenas.
 (B) I, II e III, apenas.
 (C) I, II, III e IV.
 (D) I e IV, apenas.
 (E) III e IV, apenas.

52

Durante a avaliação de um paciente, o enfermeiro observa um padrão respiratório que aumenta de um período de apnéia associado a condições cerebrais.

Esse padrão respiratório é conhecido como

- (A) respiração de Biot.
 (B) respiração de Kussmaul.
 (C) taquipnéia.
 (D) respiração de Cheyne-Stokes. ✓
 (E) apnéia.

35

O processo de enfermagem é um método que orienta o pensamento crítico e o julgamento clínico do enfermeiro direcionando a equipe de enfermagem para o cuidado.

De acordo com a Resolução Cofen nº 736/2024, o objetivo da etapa de evolução de enfermagem é

- (A) avaliar os resultados alcançados de enfermagem e saúde, permitindo a análise e revisão de todo o processo de enfermagem.
- (B) registrar as condições iniciais de saúde do paciente, permitindo a análise e revisão de todo o processo de enfermagem.
- (C) formular os diagnósticos de enfermagem, permitindo a análise e revisão de todo o processo de enfermagem.
- (D) implementar as intervenções de enfermagem, permitindo a análise e revisão de todo o processo de enfermagem.
- (E) realizar o registro no prontuário do paciente, permitindo a análise e revisão de todo o processo de enfermagem.

36

Em uma unidade de emergência o enfermeiro de plantão atende um paciente de 58 anos, sexo masculino, com queixa de dor torácica que irradia para o membro superior esquerdo, apresentando pele fria, pálida e úmida, frequência cardíaca e frequência respiratória aumentadas, quando comparadas ao padrão normal para a faixa etária.

Sobre esse atendimento, avalie as afirmativas a seguir.

- I. No exame físico o enfermeiro deve avaliar o nível de consciência, as bulhas cardíacas, a pressão arterial, os pulsos periféricos, auscultar os campos pulmonares, avaliar a motilidade intestinal, observar o débito urinário e verificar a existência de edema.
- ✓ II. O enfermeiro deve coletar dados iniciais sobre o estado atual do paciente e compará-los com a evolução do quadro clínico. Isso inclui investigar a história de dor ou desconforto torácico, dispnéia, palpitações, fadiga incomum, síncope ou outros sinais que possam indicar isquemia miocárdica.
- ✗ III. O enfermeiro deve realizar um exame mais focado em sinais e sintomas relacionados às doenças do aparelho respiratório, como a asma, e solicitar ao médico prescrição de broncodilatadores para melhorar a dor torácica e os sinais vitais alterados.

Está correto apenas o que se afirma em

(A) I e III.

(B) II e III.

37

Alterar
vêm
segm
mult
poli
ench
alter
e n
pro
Par
as a
fals

(F)

(V)

(V)

(V)

As at
(A) F
(B) V
(C) F
(D) F
(E) V

50

O traumatismo cranioencefálico pode provocar condições variadas desde uma concussão leve até o coma e a morte. Sua forma mais grave é conhecida como lesão cerebral traumática (LCT). As causas mais comuns de LCT são as quedas, os acidentes com veículos motorizados, a colisão de objetos e os assaltos.

Sobre a assistência do enfermeiro ao paciente com traumatismo cranioencefálico, é correto afirmar que:

- (A) uma leitura da Escala de Coma de Glasgow entre 3 e 8 é considerada como indicativa de traumatismo cranioencefálico grave, sendo recomendada a intubação orotraqueal.
- (B) a Escala de Coma de RASS serve de guia para avaliar o nível de consciência do paciente com base em três critérios: abertura dos olhos, respostas verbais e respostas motoras.
- (C) a Escala de Coma de Ramsay serve de guia para avaliar o nível de consciência do paciente com base em três critérios: abertura dos olhos, respostas verbais e respostas motoras.
- (D) na Escala de Coma de Glasgow, para avaliar o nível de consciência do paciente, um escore de 15 é menos responsivo, enquanto um escore de 3 é mais responsivo.
- (E) na Escala de Coma de RASS, para avaliar o nível de consciência do paciente, um escore de 15 é menos responsivo, enquanto um escore de 3 é mais responsivo.

51

O processo de enfermagem deve ser realizado de forma deliberada e sistemática em todos os contextos socioambientais em que ocorre o cuidado de enfermagem.

De acordo com a Resolução Cofen nº 736/2024, na etapa de planejamento de enfermagem, há elementos que devem ser considerados para o desenvolvimento de um plano assistencial eficaz, direcionado ao paciente, à família, à coletividade ou aos grupos especiais e compartilhado com a equipe de saúde.

Avalie se tais elementos incluem:

- I. priorização de diagnósticos de enfermagem;
- II. determinação de resultados esperados e exequíveis de enfermagem e de saúde; ✓
- III. tomada de decisão terapêutica, declarada pela prescrição de enfermagem das intervenções, ações/atividades e protocolos assistenciais; ✓
- IV. priorização da prescrição médica.

Estão corretos os itens


- (A) II, III e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) I e IV, apenas.
- (E) III e IV, apenas.

52

Durante a avaliação de um paciente hospitalizado, o enfermeiro observa um padrão respiratório caracterizado por ciclos de respiração que aumentam e diminuem em profundidade, seguidos de um período de apneia. Esse tipo de respiração é comumente associado a condições como insuficiência cardíaca ou lesões cerebrais.

Esse padrão respiratório denomina-se

- (A) respiração de Biot.
- (B) respiração de Kussmaul.
- (C) taquipneia.
- (D) respiração de Cheyne-Stokes.
- (E) apneia.



- crânioencefálico, é correto afirmar:
- (A) uma leitura da Escala de Coma de Glasgow considerada como indicativa de traumatismo cranioencefálico grave, sendo recomendada a intubação orotraqueal.
 - (B) a Escala de Coma de RASS serve de guia para avaliar o nível de consciência do paciente com base em três critérios: abertura dos olhos, respostas verbais e respostas motoras.
 - (C) a Escala de Coma de Ramsay serve de guia para avaliar o nível de consciência do paciente com base em três critérios: abertura dos olhos, respostas verbais e respostas motoras.
 - (D) na Escala de Coma de Glasgow, para avaliar o nível de consciência do paciente, um escore de 15 é menos responsivo, enquanto um escore de 3 é mais responsivo.
 - (E) na Escala de Coma de RASS, para avaliar o nível de consciência do paciente, um escore de 15 é menos responsivo, enquanto um escore de 3 é mais responsivo.

51

O processo de enfermagem deve ser realizado de forma deliberada e sistemática em todos os contextos socioambientais em que ocorre o cuidado de enfermagem.

De acordo com a Resolução Cofen nº 736/2024, na etapa de planejamento de enfermagem, há elementos que devem ser considerados para o desenvolvimento de um plano assistencial eficaz, direcionado ao paciente, à família, à coletividade ou aos grupos especiais e compartilhado com a equipe de saúde.

Avalie se tais elementos incluem:

- I. priorização de diagnósticos de enfermagem;
- II. determinação de resultados esperados e exequíveis de enfermagem e de saúde;
- III. tomada de decisão terapêutica, declarada pela prescrição de enfermagem das intervenções, ações/atividades e protocolos assistenciais;
- IV. priorização da prescrição médica.

Estão corretos os itens

- (A) II, III e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) I e IV, apenas.
- (E) III e IV, apenas.

52

Durante a avaliação de um paciente hospitalizado, o enfermeiro observa um padrão respiratório caracterizado por ciclos de respiração que aumentam e diminuem em profundidade, seguidos de um período de apneia. Esse tipo de respiração é comumente associado a condições como insuficiência cardíaca ou lesões cerebrais.

Esse padrão respiratório denomina-se

- (A) respiração de Biot.
- (B) respiração de Kussmaul.
- (C) taquipneia.
- (D) respiração de Cheyne-Stokes.
- (E) apneia.

- alternativas são, respectivamente,
- (A) F - V - F.
 - (B) F - V - V.
 - (C) ~~V - F - F.~~
 - (D) ~~V - V - F.~~
 - (E) F - F - V.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31 ?

Na consulta de enfermagem à criança, o acompanhamento dos sinais vitais e do crescimento e desenvolvimento são feitos seguindo-se as recomendações do Ministério da Saúde, com registros na Caderneta da Criança.

Sobre os procedimentos relativos a esses acompanhamentos, é correto afirmar que

- (A) o Índice de Massa Corporal (IMC) em crianças deve ser medido por meio do peso em quilograma (kg) dividido pelo valor da estatura em metros (m), expresso na seguinte fórmula: $IMC = \text{peso} / \text{estatura}$.
- (B) nas consultas de rotina, a medida da pressão arterial é obrigatória apenas a partir dos 5 anos de idade, tanto para meninas como para meninos.
- (C) na aferição do peso de crianças menores de 2 anos em balança pediátrica eletrônica (digital), a criança deve estar obrigatoriamente despida e deitada, pois se ela for posta sentada a precisão da medição fica comprometida.
- (D) a medida do perímetro cefálico deve ser aferida desde o nascimento e até o primeiro ano de vida e, a partir dessa idade, torna-se obrigatória apenas na presença de diagnóstico de microcefalia.
- (E) crianças menores de 2 anos devem ser medidas deitadas (comprimento); crianças com 2 anos ou mais devem ser medidas em pé (estatura).

- (2017), sobre as boas práticas de cateter periférico, é correto afirmar que
- (A) a aspiração para verificar o retorno de sangue antes de cada infusão é realizada para garantir a funcionalidade do cateter e prevenir complicações.
 - (B) o *flushing* pulsátil (*push-pause*) é preferível ao *flushing* contínuo, pois cria um fluxo laminar que evita a deposição de resíduos no lúmen do cateter.
 - (C) o uso de água estéril é recomendado para *flushing* e *lock* de cateteres periféricos em pacientes com restrição hídrica.
 - (D) soluções em grandes volumes, como frascos de soro, são adequadas para a obtenção de *flushing* devido ao baixo custo e acessibilidade.
 - (E) seringas menores que 10 mL devem ser utilizadas para gerar maior pressão durante o *flushing* e garantir a desobstrução do cateter.

34

Auditoria em enfermagem é a avaliação sistemática da qualidade da assistência em enfermagem, verificada por intermédio das anotações no prontuário do paciente e/ou das próprias condições do prontuário. A auditoria surge como a fase final do processo de planejamento da assistência de enfermagem, que é imprescindível à prestação de uma assistência adequada e de qualidade ao indivíduo.

Sobre os tipos de auditoria, assinale a afirmativa correta.

- (A) Auditoria operacional é feita em 10% dos prontuários de uma instituição para buscar dados que não foram anotados durante a realização da auditoria retrospectiva.
- (B) Auditoria retrospectiva é feita após a alta do paciente, em que se utiliza o prontuário para avaliação, portanto, os dados obtidos não beneficiarão aquele paciente diretamente, mas para auxiliarão na assistência de maneira global.
- (C) Auditoria concorrente é feita em 50% dos prontuários de uma instituição para buscar dados que não foram anotados quando foi realizada a auditoria retrospectiva.
- (D) Auditoria operacional é feita em 50% dos prontuários de uma instituição para buscar dados que não foram anotados durante a realização da auditoria retrospectiva e dispensa a realização de um plano auditorial.
- (E) Auditoria retrospectiva dispensa a realização de um plano auditorial e a elaboração de um relatório final, pois essas exigências são feitas apenas para a auditoria concorrente ou operacional.

58

Na assistência de enfermagem à gestante, o enfermeiro precisa estar atento à própria gestante, às pessoas que a acompanham e ao ambiente, de modo a oferecer um momento seguro e acolhedor. Espera-se que a experiência da mulher e de sua família seja a melhor possível e que o processo transcorra sem intercorrências.

Em relação ao conjunto de atividades inerentes ao cuidado com a mulher gestante para que haja uma boa vivência do parto vaginal, é correto afirmar que

- (A) sobre a assepsia para o parto vaginal, havendo necessidade de limpeza vulvar e perineal antes do exame vaginal, deve-se evitar água potável e optar por água estéril para evitar contaminação, caso haja necessidade de episiotomia.
- (B) a assepsia indicada para o parto vaginal é recomendada com higiene padrão das mãos e uso de luvas necessariamente estéreis para reduzir a contaminação cruzada entre as mulheres, as crianças e os profissionais.
- (C) caso opte por receber massagem que tenha sido ensinada a(os) seu(s) acompanhante(s), a mulher deve ser apoiada nesta opção durante o trabalho de parto.
- (D) acupuntura é uma técnica não farmacológica contraindicada às mulheres durante o trabalho de parto.
- (E) a dieta durante o trabalho de parto envolve o jejum, inclusive de líquidos.

59

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), na RDC nº 15/2012, dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde.

Com base nessas diretrizes, avalie as afirmativas a seguir.

- I. O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve ser registrado a cada ciclo de esterilização.
- II. O monitoramento com indicadores físicos é opcional, sendo realizado apenas quando houver falhas nos testes químicos ou biológicos.
- III. O uso de indicador biológico em produtos implantáveis é obrigatório em todas as cargas, e a liberação do material só deve ocorrer após a leitura negativa do indicador.
- IV. O indicador biológico deve ser utilizado diariamente e posicionado no ponto mais crítico da carga, conforme os estudos térmicos da qualificação do equipamento.

Estão corretas as afirmativas

- Galaxy M12
- (B) I e III, apenas.
 - (C) I, III e IV, apenas.

60

Um
hos
mas
Ao e
arte
as s
ven
Em
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

56

Do conjunto de ações que formam a vigilância em saúde, a vigilância epidemiológica desempenha um papel crucial no monitoramento de enfermidades que podem acometer a população, a exemplo de doenças transmissíveis e epidemias. A influenza sazonal é uma infecção viral aguda do sistema respiratório, que apresenta alta transmissibilidade.

A respeito dessa doença, avalie as afirmativas a seguir.

- I. Entre os sintomas da síndrome gripal estão a tosse seca, a mialgia e a prostração.
- II. Pelo risco de complicações respiratórias, a vacina influenza trivalente, disponível nos serviços públicos de vacinação, é indicada para crianças a partir do primeiro mês de vida até cinco anos, e também para gestantes.
- III. No contexto da Vigilância Sentinela da Influenza, a síndrome gripal se caracteriza por indivíduo com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e com início dos sintomas nos últimos sete dias.
- IV. No caso dos vírus respiratórios como o vírus influenza, são feitas coletas "aleatórias" de amostras clínicas de pacientes com síndrome gripal.

Estão corretas apenas as afirmativas

(A) I, II e IV.

(B) II e IV.

(C) I, II e III.

(D) I, III e IV.

(E) I e II.

57

Atualmente, câncer é o nome geral dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que tendem a invadir tecidos e órgãos vizinhos.

De acordo com a cartilha *ABC do Câncer*, publicada em 2020 pelo Ministério da Saúde, existem três formas principais de tratamento do câncer: cirurgia, radioterapia e quimioterapia, que podem ser usadas em conjunto, variando apenas quanto à suscetibilidade dos tumores a cada uma das modalidades terapêuticas e à sequência ideal de sua administração.

Sobre esses tratamentos, avalie as afirmativas a seguir.

- I. A radioterapia pré-operatória (prévia ou citoredutora) é o procedimento que antecede a principal modalidade de tratamento, a cirurgia, para reduzir o tumor e facilitar o procedimento operatório.
- II. A quimioterapia curativa tem a finalidade de curar pacientes com neoplasias malignas para os quais representa o principal tratamento, podendo ou não estar associada à cirurgia e à radioterapia.
- III. Uma das competências privativas do enfermeiro em quimioterapia antineoplásica é planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de enfermagem, em pacientes submetidos ao tratamento quimioterápico antineoplásico, categorizando-o como um serviço de alta complexidade.
- IV. Radioterapia pós-operatória ou pós-quimioterapia (profilática): segue-se a principal modalidade de tratamento, com a finalidade de esterilizar possíveis focos microscópicos do tumor.

As afirmativas corretas são

(A) I, II e IV, apenas.

(B) I, II e IV, apenas.

(C) I, II e IV, apenas.

(D) I, II, III e IV.

(E) III e IV, apenas.

ambiente, de modo a oferecer um momento seguro e acolhedor. Espera-se que a experiência da mulher e de sua família seja a melhor possível e que o processo transcorra sem intercorrências.

Em relação ao conjunto de atividades inerentes ao cuidado com a mulher gestante para que haja uma boa vivência do parto vaginal, é correto afirmar que

- (A) sobre a assepsia para o parto vaginal, havendo necessidade de limpeza vulvar e perineal antes do exame vaginal, deve-se evitar água potável e optar por água estéril para evitar contaminação, caso haja necessidade de episiotomia.
- (B) a assepsia indicada para o parto vaginal é recomendada com higiene padrão das mãos e uso de luvas necessariamente estéreis para reduzir a contaminação cruzada entre as mulheres, as crianças e os profissionais.
- (C) caso opte por receber massagem que tenha sido ensinada a(os) seu(s) acompanhante(s), a mulher deve ser apoiada nesta opção durante o trabalho de parto.
- (D) acupuntura é uma técnica não farmacológica contraindicada às mulheres durante o trabalho de parto.
- (E) a dieta durante o trabalho de parto envolve o jejum, inclusive de líquidos.

59

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), na RDC nº 15/2012, dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde.

Com base nessas diretrizes, avalie as afirmativas a seguir.

- I. O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve ser registrado a cada ciclo de esterilização.
- II. O monitoramento com indicadores físicos é opcional, sendo realizado apenas quando houver falhas nos testes químicos ou biológicos.
- III. O uso de indicador biológico em produtos implantáveis é obrigatório em todas as cargas, e a liberação do material só deve ocorrer após a leitura negativa do indicador.
- IV. O indicador biológico deve ser utilizado diariamente e posicionado no ponto mais crítico da carga, conforme os estudos térmicos da qualificação do equipamento.

Estão corretas as afirmativas

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

menta as boas
cos de Saúde
nciamento de
ana e animal,
ursos naturais

orreta sobre o
(RSS)

grupo A devem
sua capacidade
nte do volume,
a dos usuários e

sacos podem ser
a instituição.

fácil putrefação
cada 48 horas;
24

obrigatoriamente
nsiderados rejeitos

ecisam ser tratados
se melhos

nte, o enfermeiro
ntercostal, na linha

re local é

co de Saúde (SUS),
ude (LOS), avalie as

de alimentos para
bebidas, pois esta
sistema.

cia às pessoas por
o e recuperação da
s assistenciais e das

ecução de ações de
ológica, de saúde do
a integral, inclusive

ca de medicamentos,
s insumos de interesse
dução.

Do conjunto de ações de
vigilância epidemiológica, desempenha-se a
monitoramento de enfermidades que podem acometer a
população, a exemplo de doenças transmissíveis e epidemias.
A influenza sazonal é uma infecção viral aguda do sistema
respiratório, que apresenta alta transmissibilidade.

A respeito dessa doença, avalie as afirmativas a seguir.

- I. Entre os sintomas da síndrome gripal estão a tosse seca, a
mialgia e a prostração.
- II. Pelo risco de complicações respiratórias, a vacina Influenza,
trivalente, disponível nos serviços públicos de vacinação, é
indicada para crianças a partir do primeiro mês de vida até
cinco anos, e também para gestantes.
- III. No contexto da Vigilância Sentinela da Influenza, a síndrome
gripal se caracteriza por indivíduo com febre, mesmo que
referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e com
início dos sintomas nos últimos sete dias.
- IV. No caso dos vírus respiratórios como o vírus Influenza, são
feitas coletas "aleatórias" de amostras clínicas de pacientes
com síndrome gripal.

Estão corretas apenas as afirmativas

(A) I, II e IV.

(B) II e IV.

(C) I, II e III.

(D) I, III e IV.

(E) I e II.

57

Atualmente, câncer é o nome geral dado a um conjunto de mais
de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado
de células que tendem a invadir tecidos e órgãos vizinhos.

De acordo com a cartilha ABC do Câncer, publicada em 2020 pelo
Ministério da Saúde, existem três formas principais de tratamento
do câncer: cirurgia, radioterapia e quimioterapia, que podem ser
usadas em conjunto, variando apenas quanto
à suscetibilidade dos tumores a cada uma das modalidades
terapêuticas e à sequência ideal de sua administração.

Sobre esses tratamentos, avalie as afirmativas a seguir.

- I. A radioterapia pré-operatória (prévia ou citoredutora) é o
procedimento que antecede a principal modalidade de
tratamento, a cirurgia, para reduzir o tumor e facilitar o
procedimento operatório.
- II. A quimioterapia curativa tem a finalidade de curar pacientes
com neoplasias malignas para os quais representa o principal
tratamento, podendo ou não estar associada à cirurgia e à
radioterapia.
- III. Uma das competências privativas do enfermeiro em
quimioterapia antineoplásica é planejar, organizar,
supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de
enfermagem, em pacientes submetidos ao tratamento
quimioterápico antineoplásico, categorizando-o como um
serviço de alta complexidade.
- IV. Radioterapia pós-operatória ou pós-quimioterapia
(profilática): segue-se à principal modalidade de tratamento,
com a finalidade de esterilizar possíveis focos microscópicos
do tumor.

As afirmativas corretas são

(A) I, III e IV, apenas.

(B) I, II e IV, apenas.

(C) II, III e IV, apenas.

(D) I, II, III e IV.

(E) III e IV, apenas.

TIPO AZUL - PÁGINA 14

48

As recomendações para Suporte Básico de Vida (SBV) e para Suporte Avançado de Vida Cardiovascular (SAVC) estão combinadas nas diretrizes da American Heart Association (AHA) publicadas em 2020.

Sobre as principais novas alterações de SBV e SAVC em adultos, avalie as afirmativas a seguir.

- I. O atendimento do paciente após o retorno da circulação espontânea requer muita atenção à oxigenação, ao controle da pressão arterial, à avaliação da intervenção coronária percutânea, ao controle direcionado de temperatura e ao neuroprognóstico multimodal. ✓
- II. O acesso intraósseo é a via de primeira escolha de administração de medicação durante a ressuscitação no SAVC. ✓
- III. Mensurar continuamente a pressão arterial sanguínea e o teor de dióxido de carbono ao final da expiração durante a ressuscitação de SAVC pode ser útil para melhorar a qualidade da reanimação cardiopulmonar.
- IV. As recomendações anteriores da AHA sobre a administração de epinefrina foram reafirmadas, com ênfase em sua administração mais precoce.

As afirmativas corretas são

- (A) I, II e III, apenas.
 (B) I, III e IV, apenas. ✓
 (C) II, III e IV, apenas.
 (D) I, II e IV, apenas.
 (E) I, II, III e IV.

49

Um dos recursos de proteção contra infecções é a imunização por meio de vacinas. No Brasil, o Ministério da Saúde disponibiliza uma ampla cartela de imunizantes pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). Ao receber as pessoas na sala de vacina, o profissional precisa estar atento ao calendário e à caderneta e/ou ao cartão de vacinação do usuário, para que possa avaliar corretamente quais vacinas e doses devem ser administradas.

Nesse sentido, na avaliação da administração da vacina rotavírus humano G1P [8] (atenuada) – VRH, para uma criança com quatro meses de idade, é correto afirmar que

- (A) essa criança pode tomar a 2ª dose da vacina, pois na avaliação da caderneta verificou-se que ela tomou a 1ª dose aos dois meses de idade. ✓
 (B) se, na administração da 2ª dose, a criança cuspir, será necessário reaplicar a dose.
 (C) essa vacina é a única que pode ser administrada diante de quadro agudo de gastroenterite, pois ela atua para a resolução desse tipo de quadro.
 (D) essa vacina só pode ser administrada a partir dos seis meses de idade. ✓
 (E) essa vacina não faz parte do calendário, sendo administrada apenas quando há surtos.

Galaxy M12

50

O traumatismo crânioencefálico varia desde uma contusão leve até uma lesão mais grave e conhecida como hemorragia intracranial. As causas mais comuns são quedas e acidentes com veículos motorizados.

Sobre a assistência de enfermagem ao paciente com traumatismo crânioencefálico, é

- (A) uma leitura da escala de consciência considerada correta, sendo reavaliada a cada hora. ✓
 (B) a Escala de Coma de Glasgow, avaliando a consciência dos olhos, resposta verbal e resposta motora.
 (C) a Escala de Coma de Glasgow, avaliando a consciência dos olhos, resposta verbal e resposta motora.
 (D) na Escala de Coma de Glasgow, avaliando a consciência dos olhos, resposta verbal e resposta motora, enquanto um enfermeiro observa a respiração.
 (E) na Escala de Coma de Glasgow, avaliando a consciência dos olhos, resposta verbal e resposta motora, enquanto um enfermeiro observa a respiração e um outro enfermeiro observa a saturação de oxigênio.

51

O processo de avaliação de risco é deliberada e sistemática, em que ocorre o cruzamento de dados de acordo com a avaliação de risco planejada de

considerados para a avaliação de risco, grupos especiais e

Avalie se tais elementos

- I. priorização de
- II. determinação de enfermagem
- III. tomada de decisão de enfermagem assistenciais;

IV. priorização da

Estão corretos os

- (A) II, III e IV, apenas. ✓
 (B) I, II e III, apenas.
 (C) I, II, III e IV.
 (D) I e IV, apenas.
 (E) III e IV, apenas.

52

Durante a avaliação de risco, observa-se um padrão de respiração que ocorre de um período de 10 segundos associado a uma parada respiratória cerebral.

53

A RDC nº 222, de 28 de março de 2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), pretende minimizar os riscos inerentes ao gerenciamento de resíduos no país no que diz respeito à saúde humana e animal, bem como à proteção ao meio ambiente e aos recursos naturais renováveis.

Tendo por base essa RDC, assinale a afirmativa correta sobre o gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS).

- (A) Os sacos para o acondicionamento de RSS do grupo A devem ser substituídos ao atingirem o limite de 2/3 de sua capacidade ou então a cada 48 horas, independentemente do volume, visando ao conforto ambiental e à segurança dos usuários e profissionais.
- (B) O esvaziamento ou reaproveitamento dos sacos podem ser feitos quando não houver sacos suficientes na instituição.
- (C) Os sacos contendo RSS do grupo A de fácil putrefação devem ser substituídos no máximo a cada 48 horas, independentemente do volume.
- (D) Os RSS do grupo A que não precisam ser obrigatoriamente tratados e os RSS após o tratamento são considerados rejeitos e devem ser acondicionados em saco preto.
- (E) Os RSS do grupo A que obrigatoriamente precisam ser tratados devem ser acondicionados em sacos pretos.

54

Durante a ausculta cardíaca de um paciente, o enfermeiro posiciona o estetoscópio no quinto espaço intercostal, na linha médio-clavicular esquerda.

A válvula cardíaca que está sendo avaliada nesse local é

- (A) o foco de Erb (ou Terceiro Foco).
- (B) a pulmonar.
- (C) a tricúspide.
- (D) a aórtica.
- (E) a mitral.

55

Sobre os objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido pela Lei Orgânica de Saúde (LOS), avalie as afirmativas a seguir.

- I. Compete ao SUS a fiscalização e a inspeção de alimentos para consumo humano, exceto o de água e bebidas, pois esta fiscalização é de responsabilidade de outro sistema.
- II. Entre os objetivos do SUS está a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- III. O campo de atuação do SUS inclui a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador, de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, e de saúde bucal.
- IV. Compete ao SUS a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.

Estão corretas apenas as afirmativas

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II, III e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) I, III e IV.

GRUPO ENFERMAGEM - MANHÃ

56

Do conjunto de vigilância epidemiológica, monitoramento da população, a exemplo da influenza sazonal e do resfriado respiratório, que

A respeito dessa

- I. Entre os sintomas, há mialgia e a prostração.
- II. Pelo risco de complicações, é considerada trivalente, dissemínada, com duração indicada para até cinco anos, e t
- III. No contexto de gripe, se caracteriza por ser referida, acometendo o início dos sintomas.
- IV. No caso dos vírus, as medidas feitas coletas com síndrome

Estão corretas apenas

- (A) I, II e IV.
- (B) II e IV.
- (C) I, II e III.
- (D) I, II e IV.
- (E) I e II.

57

Atualmente, câncer de 100 doenças que de células que tend

De acordo com a Lei do Ministério da Saúde do câncer: cirurgia, usadas em a suscetibilidade de terapêuticas e a seq

Sobre esses tratame

- I. A radioterapia é um procedimento de tratamento, a ser realizado em conjunto com o procedimento de quimioterapia.
- II. A quimioterapia com neoplasias é um tratamento, podendo ser realizado em conjunto com a radioterapia.
- III. Uma das funções da quimioterapia é supervisionar, e não enfermagem, e quimioterápico serviço de alta co
- IV. Radioterapia (prolática): segue com a finalidade do tumor.

As afirmativas corretas

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I, II e IV.
- (E) I, II e IV, apenas.

Alterações no clima do planeta têm sido um tema preocupante e vêm ocupando as agendas dos líderes mundiais e de vários segmentos sociais. Esses eventos ameaçam a vida e geram múltiplos problemas, mobilizando debates para a proposição de políticas e programas, em especial na saúde pública. Grandes enchentes e ondas de calor são consequências atribuídas às alterações climáticas. Nessas situações, problemas de saúde física e mental são pontos de atenção dos governantes e dos profissionais de saúde.

Para o caso de eventos que envolvam alterações climáticas, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- ☒ (F) A leptospirose é uma doença infecciosa preocupante, pois a lama de enchentes tem alto poder infectante. A transmissão se dá por meio da exposição à urina de animais infectados quando a pessoa possui lesões na pele. Com a pele íntegra não há risco de infecção.
- ☒ (V) Para evitar o tétano acidental, a pessoa deve acessar os lugares acometidos por enchentes usando botas e luvas. Em caso de ferimento durante ou após uma enchente, deve-se verificar a data da última dose da vacina e, se for necessário, procurar o serviço de saúde/profissional de saúde para avaliar a necessidade de reforço.
- ☒ (V) Ondas de calor são eventos cada vez mais frequentes e a intensa exposição ao sol pode causar problemas de variados graus de gravidade. Uma pessoa com transpiração, fraqueza, tonturas, desmaios, náuseas, dor de cabeça, câibras musculares e diarreias pode estar sofrendo de exaustão térmica. No caso de insolação, entre às medidas de primeiros socorros estão a aplicação de compressas de água fria na testa, pescoço, axilas e virilhas e, se possível, deve-se borrifar delicadamente água fria em todo o corpo da pessoa.
- ☒ (V) No atendimento na unidade de saúde de um paciente de 25 anos, sexo masculino, que enfrentou uma enchente em casa e apresenta doença diarreica aguda, deve-se fazer a avaliação do estado de hidratação do paciente. Constatada a desidratação, deve-se administrar continuamente a solução de sais de reidratação oral, até que desapareçam os sinais de desidratação. No plano de educação em saúde devem constar as medidas de higiene pessoal, domiciliar e dos alimentos.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) F - V - F - V.

(B) ~~V - F - V - F~~

(C) ~~F - V - F - F~~

☒ (D) F - V - V - V.

(E) ~~V - F - F - V~~

33

As infecções da corrente sanguínea relacionadas a cateteres centrais (ICSRC) estão associadas a importantes desfechos desfavoráveis à saúde.

Nos Estados Unidos da América (EUA), a mortalidade atribuível a essa síndrome geralmente ultrapassa os 10%, podendo chegar a 25% em pacientes de maior risco.

Considerando as orientações descritas no Caderno de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde da Anvisa (2017), sobre as boas práticas de *flushing* e a manutenção do cateter periférico, é correto afirmar que

- (A) a aspiração para verificar o retorno de sangue antes de cada infusão é realizada para garantir a funcionalidade do cateter e prevenir complicações.
- (B) o *flushing* pulsátil (*push-pause*) é preferível ao *flushing* contínuo, pois cria um fluxo laminar que evita a deposição de resíduos no lúmen do cateter.
- (C) o uso de água estéril é recomendado para *flushing* e *lock* de cateteres periféricos em pacientes com restrição hídrica.
- (D) soluções em grandes volumes, como frascos de soro, são adequadas para a obtenção de *flushing* devido ao baixo custo e acessibilidade.
- (E) seringas menores que 10 mL devem ser utilizadas para gerar maior pressão durante o *flushing* e garantir a desobstrução do cateter.

34

Auditoria em enfermagem é a avaliação sistemática da qualidade da assistência em enfermagem, verificada por intermédio das anotações no prontuário do paciente e/ou das próprias condições do prontuário. A auditoria surge como a fase final do processo de planejamento da assistência de enfermagem, que é imprescindível à prestação de uma assistência adequada e de qualidade ao indivíduo.

Sobre os tipos de auditoria, assinale a afirmativa correta.

- (A) Auditoria operacional é feita em 10% dos prontuários de uma instituição para buscar dados que não foram anotados durante a realização da auditoria retrospectiva.
- (B) Auditoria retrospectiva é feita após a alta do paciente, em que se utiliza o prontuário para avaliação, portanto, os dados obtidos não beneficiarão aquele paciente diretamente, mas para auxiliar na assistência de maneira global.
- (C) Auditoria concorrente é feita em 50% dos prontuários de uma instituição para buscar dados que não foram anotados quando foi realizada a auditoria retrospectiva.
- (D) Auditoria operacional é feita em 50% dos prontuários de uma instituição para buscar dados que não foram anotados durante a realização da auditoria retrospectiva e dispensa a realização de um plano auditorial.
- (E) Auditoria retrospectiva dispensa a realização de um plano auditorial e a elaboração de um relatório final, pois essas exigências são feitas apenas para a auditoria concorrente ou operacional.

Em relação ao tema, as seguintes afirmativas, exceto uma, estão corretas. Assinale-a.

- (A) A Rede Alynne promove um modelo de cuidado humanizado e integral para a saúde da gestante, parturiente, puérpera e da criança e objetiva a redução da morbimortalidade materna e infantil, com ênfase no componente neonatal, sobretudo da população negra e indígena.
- (B) No componente pré-natal que se desenvolve na Atenção Primária à Saúde (APS), a promoção da saúde inclui a saúde sexual e o planejamento reprodutivo, ações que devem constar da consulta de enfermagem.
- (C) A Rede Alynne manteve os exames contemplados na Rede Cegonha e acrescentou o teste para HTLV, que é um teste rápido para hepatite B e o teste rápido para hepatite C.
- (D) O foco da Rede Alynne é a gestação de baixo risco, não incluindo em seus componentes ambulatoriais de gestação e puerpério de alto risco.
- (E) Fazem parte das ações no modelo de cuidado da Rede Alynne garantir a segurança alimentar e nutricional no início da vida com a oferta de leite humano nas unidades neonatais e garantir ambulatorio de seguimento de recém-nascidos e de crianças egressas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

47

Durante as etapas do período perioperatório, o enfermeiro desempenha papéis específicos para garantir a segurança e o bem-estar do paciente.

Assinale a opção que descreve corretamente uma ação correspondente ao período transoperatório.

- (A) Orientar o paciente e sua família sobre os cuidados necessários no domicílio após a alta hospitalar. *Pós*
- (B) Verificar se o paciente realizou o jejum pré-operatório conforme recomendado.
- (C) Monitorar continuamente os sinais vitais e manter a segurança do paciente durante o procedimento cirúrgico.
- (D) Avaliar a dor e administrar analgésicos no período imediato após o procedimento. *Pós*
- (E) Revisar exames pré-operatórios e obter o consentimento informado. *Pre*

resíduos e o país no qual bem como à proteção ao meio ambiente e aos recursos renováveis.

Tendo por base essa RDC, assinale a afirmativa correta sobre o gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS).

- (A) Os sacos para o acondicionamento de RSS do grupo A devem ser substituídos ao atingirem o limite de 2/3 de sua capacidade ou então a cada 48 horas, independentemente do volume, visando ao conforto ambiental e à segurança dos usuários e profissionais.
- (B) O esvaziamento ou reaproveitamento dos sacos podem ser feitos quando não houver sacos suficientes na instituição.
- (C) Os sacos contendo RSS do grupo A de fácil putrefação devem ser substituídos no máximo a cada 48 horas, independentemente do volume.
- (D) Os RSS do grupo A que não precisam ser obrigatoriamente tratados e os RSS após o tratamento são considerados rejeitos e devem ser acondicionados em saco preto.
- (E) Os RSS do grupo A que obrigatoriamente precisam ser tratados devem ser acondicionados em sacos pretos.

54

Durante a ausculta cardíaca de um paciente, o enfermeiro posiciona o estetoscópio no quinto espaço intercostal, na linha médio-clavicular esquerda.

A válvula cardíaca que está sendo avaliada nessa local é

- (A) o foco de Erb (ou Terceiro Foco).
- (B) a pulmonar.
- (C) a tricúspide.
- (D) a aórtica.
- (E) a mitral.

55

Sobre os objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido pela Lei Orgânica de Saúde (LOS), avalie as afirmativas a seguir.

- I. Compete ao SUS a fiscalização e a inspeção de alimentos para consumo humano, exceto o de água e bebidas, pois esta fiscalização é de responsabilidade de outro sistema.
- II. Entre os objetivos do SUS está a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- III. O campo de atuação do SUS inclui a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador, de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, e de saúde bucal.
- IV. Compete ao SUS a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.

Estão corretas apenas as afirmativas

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II, III e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) I, III e IV.

A respeito dessa doença

- I. Entre os sintomas da síndrome mialgia e a prostração.
- II. Pelo risco de complicações trivalentes, disponível nos 5 indicada para crianças a partir de cinco anos; e também para
- III. No contexto da Vigilância S gripal se caracteriza por referida, acompanhada de início dos sintomas nos últimos
- IV. No caso dos vírus respiratórios, feitas coletas "aleatórias" com síndrome gripal.

Estão corretas apenas as afirmativas

- (A) I, II e IV.
- (B) II e IV.
- (C) I, II e III.
- (D) I, III e IV.
- (E) I e II.

57

Atualmente, câncer é o nome de 100 doenças que têm em comum a presença de células que tendem a invadir e destruir os tecidos. De acordo com a cartilha do Ministério da Saúde, existem dois tipos de tratamento para o câncer: cirurgia, radioterapia e quimioterapia.

Sobre esses tratamentos,

- I. A radioterapia pré-operatória é um procedimento que, antes do tratamento, a cirurgia, tem o objetivo de reduzir o tamanho do tumor.
- II. A quimioterapia curativa é utilizada no tratamento de neoplasias malignas, podendo ser utilizada isoladamente ou em conjunto com a radioterapia.
- III. Uma das competências da enfermagem é supervisionar, executar e avaliar os procedimentos de quimioterapia e radioterapia em serviço de alta complexidade.
- IV. Radioterapia paliativa (profilática): segue com a finalidade de aliviar os sintomas do tumor.

As afirmativas corretas são

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) III e IV, apenas.

50

O traumatismo cranioencefálico pode provocar condições que variam desde uma concussão leve até o coma e a morte. Sua forma mais grave é conhecida como lesão cerebral traumática (LCT). As causas mais comuns de LCT são as quedas, os acidentes com veículos motorizados, a colisão de objetos e os assaltos.

Sobre a assistência do enfermeiro ao paciente com traumatismo cranioencefálico, é correto afirmar que

- (A) uma leitura da Escala de Coma de Glasgow entre 3 e 8 é considerada como indicativa de traumatismo cranioencefálico grave, sendo recomendada a intubação orotraqueal.
- (B) a Escala de Coma de RASS serve de guia para avaliar o nível de consciência do paciente com base em três critérios: abertura dos olhos, respostas verbais e respostas motoras.
- (C) a Escala de Coma de Ramsay serve de guia para avaliar o nível de consciência do paciente com base em três critérios: abertura dos olhos, respostas verbais e respostas motoras.
- (D) na Escala de Coma de Glasgow, para avaliar o nível de consciência do paciente, um escore de 15 é menos responsivo, enquanto um escore de 3 é mais responsivo.
- (E) na Escala de Coma de RASS, para avaliar o nível de consciência do paciente, um escore de 15 é menos responsivo, enquanto um escore de 3 é mais responsivo.

51

O processo de enfermagem deve ser realizado de forma deliberada e sistemática em todos os contextos socioambientais em que ocorre o cuidado de enfermagem.

De acordo com a Resolução Cofen nº 736/2024, na etapa de planejamento de enfermagem, há elementos que devem ser considerados para o desenvolvimento de um plano assistencial eficaz, direcionado ao paciente, à família, à coletividade ou aos grupos especiais e compartilhado com a equipe de saúde.

Avalie se tais elementos incluem:

- I. priorização de diagnósticos de enfermagem;
- II. determinação de resultados esperados e exequíveis de enfermagem e de saúde;
- III. tomada de decisão terapêutica, declarada pela prescrição de enfermagem das intervenções, ações/atividades e protocolos assistenciais;

~~IV. priorização da prescrição médica.~~

Estão corretos os itens

- (A) II, III e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) I e IV, apenas.
- (E) III e IV, apenas.

52

Durante a avaliação de um paciente hospitalizado, o enfermeiro observa um padrão respiratório caracterizado por ciclos de respiração que aumentam e diminuem em profundidade, seguidos de um período de apneia. Esse tipo de respiração é comumente associado a condições como insuficiência cardíaca ou lesões cerebrais.

Esse padrão respiratório denomina-se

- (A) respiração de Biot.
- (B) respiração de Kussmaul.



45

No contexto do gerenciamento de enfermagem em serviços de saúde, a atuação do enfermeiro gestor envolve a coordenação de processos que assegurem a qualidade da assistência e o bom funcionamento das equipes. Além de liderar a equipe de enfermagem, o enfermeiro desempenha a função de gerenciar estratégias de educação continuada, avaliar o desempenho dos profissionais e garantir o dimensionamento adequado do pessoal, conforme as necessidades assistenciais.

Para assegurar a eficácia na gestão do processo de trabalho de enfermagem, é essencial que o enfermeiro compreenda as especificidades da liderança, avalie as condições organizacionais e aplique parâmetros técnicos na definição da carga de trabalho.

Com base nesse contexto, avalie as afirmativas a seguir.

- I. Para que uma organização efetive a avaliação de desempenho como estratégia de desenvolvimento pessoal, é necessário que seja feito o diagnóstico situacional, ou seja, devem ser conhecidas a filosofia da organização, a dinâmica organizacional e as características dos recursos humanos.
- II. A estrutura administrativa que tem a educação continuada vinculada técnica e administrativamente ao departamento de enfermagem favorece para que a educação continuada tenha coordenação própria, autoridade nas próprias decisões e comunicação horizontal com as demais divisões.
- III. Considerando os parâmetros para o dimensionamento de enfermagem presentes no Parecer Normativo nº 1/2024 do Cofen, para efeito de cálculo, deverá ser observada a cláusula contratual adotada quanto a Carga Horária Semanal (CHS), a Taxa de Ocupação (TO) da Unidade de Internação e o Índice de Segurança Técnica (IST) de, no mínimo, 15% do total, dos quais 8,3% são referentes a férias e 6,7%, a ausências não previstas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

46

A Rede Alyne foi instituída pela Portaria GM/MS nº 5.118/2012, uma das principais iniciativas do Governo Federal para a Atenção Primária à Saúde.

A Rede Alyne tem como objetivo a integralização da atenção à saúde, com ações diretas e indiretas, técnicas e educativas, visando conhecer a Rede Alyne e sua qualificação ao público-alvo. Em relação ao tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A Rede Alyne promove a integralização da atenção à saúde, com foco na criança e no adolescente, com ênfase na população negra e indígena.
- (B) No componente primário à saúde (APS), a Rede Alyne atua com ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, com foco na população negra e indígena.
- (C) A Rede Alyne mantém a atuação na atenção primária à saúde, com foco na população negra e indígena, e atua também na atenção secundária e terciária.
- (D) O foco da Rede Alyne é a atenção primária à saúde, com foco na população negra e indígena, e atua também na atenção secundária e terciária.
- (E) Fazem parte das ações da Rede Alyne a garantia da segurança do paciente, com a oferta de serviços de emergência, a garantia da continuidade da assistência e a garantia da atenção ambulatorial para crianças egressas de internação.

47

Durante as etapas do processo de atendimento, o enfermeiro desempenha papéis essenciais para o bem-estar do paciente.

Assinale a opção que corresponde ao papel do enfermeiro durante o atendimento.

- (A) Orientar o paciente e a família sobre o cuidado no domicílio após a alta.
- (B) Verificar se o paciente está conforme recomendações do médico.
- (C) Monitorar continuamente o paciente durante o procedimento.
- (D) Avaliar a dor e administrar o analgésico após o procedimento.
- (E) Revisar exames pré e pós-operatórios.

ica referente
de doação.

ir, coordenar,
o técnico de
ecido, a seus
biológico para

ção de órgãos,
gem, podendo
fermeiro.
ação, captação
deve seguir
as científicas,

crônica (DRC)
da progressão
em, ele relata
moderado em
s revelam Hb
8 mg/dL.

suspender a
de aumento da

fósforo para

fósforo sérico

marcadores

em fósforo e
crição médica.

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um dos serviços de referência para o cuidado com as pessoas que têm Transtornos do Espectro do Autismo (TEA). Como parte da equipe de profissionais de saúde, o enfermeiro desenvolve ações de cuidado com as pessoas que têm TEA e suas famílias.

Sobre esse tema, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Um Projeto Terapêutico Singular (PTS), voltado à pessoa com TEA, deve considerar ações que estimulem a sua autonomia e independência cotidiana.
- (✓) Entre as tecnologias recomendadas no cuidado com as pessoas que têm TEA, a enfermeira pode aplicar a comunicação suplementar e alternativa, tais como gestos, símbolos e figuras.
- () No caso de pessoas com TEA, o PTS deve ser construído com a família, sem a participação da pessoa com TEA, pois o processo de construção pode acarretar crises dissociativas.
- () No caso de a pessoa com TEA usar psicofármacos, a enfermeira deve incluir no planejamento e nas ações de cuidado a orientação sobre os efeitos colaterais e, se for o caso, ajudar na escolha dos melhores horários para o uso dos medicamentos.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V - V - V - F.
- (B) V - V - F - V.
- (C) ~~F - F - V - V.~~
- (D) ~~V - F - F - V.~~
- (E) F - V - V - F.