



Simulado Final

TRT 15

Analista Judiciário - Odontologia

Pós-Edital

Simulado

Simulado Final TRT-15 (Analista Judiciário - Odontologia)

Nome: _____

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso para **Analista Judiciário - Odontologia do TRT-15**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - Os participantes têm das **8:00h às 13:30h** para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

<https://forms.gle/bPdPDTC5ZJJFsowu9>

- | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 - A B C D E | 13 - A B C D E | 25 - A B C D E | 37 - A B C D E | 49 - A B C D E |
| 02 - A B C D E | 14 - A B C D E | 26 - A B C D E | 38 - A B C D E | 50 - A B C D E |
| 03 - A B C D E | 15 - A B C D E | 27 - A B C D E | 39 - A B C D E | 51 - A B C D E |
| 04 - A B C D E | 16 - A B C D E | 28 - A B C D E | 40 - A B C D E | 52 - A B C D E |
| 05 - A B C D E | 17 - A B C D E | 29 - A B C D E | 41 - A B C D E | 53 - A B C D E |
| 06 - A B C D E | 18 - A B C D E | 30 - A B C D E | 42 - A B C D E | 54 - A B C D E |
| 07 - A B C D E | 19 - A B C D E | 31 - A B C D E | 43 - A B C D E | 55 - A B C D E |
| 08 - A B C D E | 20 - A B C D E | 32 - A B C D E | 44 - A B C D E | 56 - A B C D E |
| 09 - A B C D E | 21 - A B C D E | 33 - A B C D E | 45 - A B C D E | 57 - A B C D E |
| 10 - A B C D E | 22 - A B C D E | 34 - A B C D E | 46 - A B C D E | 58 - A B C D E |
| 11 - A B C D E | 23 - A B C D E | 35 - A B C D E | 47 - A B C D E | 59 - A B C D E |
| 12 - A B C D E | 24 - A B C D E | 36 - A B C D E | 48 - A B C D E | 60 - A B C D E |

SIMULADO NO SISTEMA DE QUESTÕES

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para fazer este simulado também no SQ!

<https://coruja.page.link/tND7>

CONHECIMENTOS GERAIS**LÍNGUA PORTUGUESA***Felipe Luccas***TEXTO 01**

Em 2018 a pessoa comum sente-se cada vez mais irrelevante. Um monte de palavras misteriosas são despejadas freneticamente em TED Talks, *think tanks* governamentais e conferências de alta tecnologia — globalização, *blockchain*, engenharia genética, inteligência artificial, aprendizado de máquina —, e as pessoas comuns bem podem suspeitar que nenhuma dessas palavras tem a ver com elas. A narrativa liberal era sobre pessoas comuns. Como ela pode continuar a ser relevante num mundo de ciborgues e algoritmos em rede?

No século XX, as massas se revoltaram contra a exploração e buscaram traduzir seu papel vital na economia em poder político. Agora as massas temem a irrelevância e querem freneticamente usar seu poder político restante antes que seja tarde. O Brexit e a ascensão de Trump poderiam, assim, demonstrar uma trajetória contrária à das revoluções socialistas tradicionais. As revoluções russa, chinesa e cubana foram feitas por pessoas que eram vitais para a economia, mas às quais faltava poder político; em 2016, Trump e Brexit foram apoiados por muita gente que ainda usufruía de poder político, mas que temia estar perdendo seu valor na economia. Talvez, no século XXI, as revoltas populares sejam dirigidas não contra uma elite econômica que explora pessoas, mas contra a elite econômica que já não precisa delas. Talvez seja uma batalha perdida. É muito mais difícil lutar contra a irrelevância do que contra a exploração.

(Fonte: HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21. Companhia das Letras. 2018. Adaptado)

1. No primeiro parágrafo do texto, afirma-se, essencialmente, que
 - a) o sentimento de irrelevância tomou conta das pessoas comuns em face do avanço da narrativa liberal.
 - b) a narrativa liberal conquista mais espaço ao se distanciar das pessoas comuns e estimular o progresso tecnológico.
 - c) os seres humanos se sentem ameaçados com a tendência de substituição da mão de obra humana por máquinas.
 - d) as terminologias do mundo digital geram um sentimento de distanciamento e exclusão nas pessoas comuns.
 - e) *blockchain*, inteligência artificial e aprendizado de máquina são conceitos alheios à sociedade contemporânea.

2. No contexto do segundo parágrafo, a frase *É muito mais difícil lutar contra a irrelevância do que contra a exploração*
 - a) dá como irreversível a perda de espaço das massas no contexto econômico atual.
 - b) demonstra a transição da natureza das revoltas populares no século XXI.
 - c) atesta que a exploração econômica não perdura mais no século XXI.
 - d) ameniza a gravidade das condições de exploração vividas por trabalhadores no século passado.
 - e) vislumbra a luta popular apenas no campo político, como no Brexit e na ascensão de Trump.

3. A partir do texto, afirma-se corretamente:

- a) A crase *mas às quais faltava poder político* (2º parágrafo) é facultativa e pode ser suprimida.
- b) A vírgula colocada imediatamente após “assim” pode ser suprimida, sem prejuízo da correção gramatical em *O Brexit e a ascensão de Trump poderiam, assim, demonstrar uma trajetória contrária à das revoluções socialistas tradicionais.* (2º parágrafo)
- c) O elemento sublinhado em *Como ela pode continuar a ser relevante num mundo de ciborgues e algoritmos em rede?* (1º parágrafo) refere-se à “pessoa comum”.
- d) No segmento *demonstrar uma trajetória contrária à das revoluções socialistas tradicionais* (2º parágrafo), o emprego da crase indica a elipse da palavra “trajetória”.
- e) O elemento sublinhado em *mas contra a elite econômica que já não precisa delas* (2º parágrafo) refere-se às revoltas populares.

4. *As revoluções russa, chinesa e cubana foram feitas por pessoas que eram vitais para a economia.*

Transpondo-se a frase acima para a voz ativa, a forma verbal resultante deverá ser:

- a) fazem
- b) faziam
- c) fizeram
- d) são feitas
- e) fizessem

5. A expressão sublinhada deve sua flexão ao verbo em negrito em:

- a) *Trump e Brexit **foram apoiados** por muita gente.*
- b) *A narrativa liberal **era** sobre pessoas comuns.*
- c) *nenhuma dessas palavras **tem** a ver com elas.*
- d) *mas às quais faltava **poder político**.*
- e) *Agora as massas **temem** a irrelevância.*

6. Está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase:

- a) *Blockchain, tecnologia capaz de garantir a segurança de dados virou alvo de práticas criminosas.*
- b) *Convém afirmar, que a globalização tem encurtado a distância entre as pessoas ao redor do mundo.*
- c) *Faz pouco tempo, em que a inteligência artificial, era coisa só de livro de ficção científica.*
- d) *Os processos e métodos envolvidos na engenharia genética, lidam com dilemas éticos.*
- e) *O perigo não está na humanização da máquina; mas, na mecanização do ser humano.*

7. É adequado o emprego do elemento sublinhado na frase:

- a) A homenagem não fez jus da memória do artista.
- b) Não há referência alguma à informações privilegiadas.
- c) Visando na sonhada aposentadoria, decidi abrir uma poupança.
- d) O político se mostrava alheio com a população.
- e) Os oficiais foram convocados ao conselho comunitário.

8. As normas de concordância verbal encontram-se plenamente observadas na frase:

- a) *Haviam muitos anos que não vinha ao Rio de Janeiro para passear com a família.*
- b) *As rodovias que serão objeto de concessão para iniciativa privada estão localizadas na Bahia.*
- c) *Estima-se, na lei orçamentária, as receitas a serem arrecadadas durante o exercício financeiro.*
- d) *Faz parte do jogo político negociar e debater ideias na arena pública.*
- e) *Sobre os recentes acontecimentos não cabe manifestações de apreço algum.*

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
Eduardo Mocellin

9. Uma prova de Raciocínio Lógico-Matemático foi constituída de cinco questões, que devem ser respondidas com verdadeiro (V) ou falso (F). A tabela a seguir mostra as respostas assinaladas por quatro estudantes:

Estudantes	Questões				
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a
Lauro	F	F	V	F	F
José	F	V	V	F	V
Miguel	V	F	V	F	V
Paulo	V	F	F	V	F

Sabe-se que um dos quatro estudantes acertou todas as questões, outro errou todas as questões e outro acertou somente duas. O número de respostas certas do estudante que restou foi:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

10. Observe a sequência de figuras a seguir:



A próxima figura da sequência é:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)


11. A negação da afirmação “se estou doente, então não jogo bola” é:

- a) Se jogo bola, então não estou doente.
- b) Não estou doente ou não jogo bola
- c) Estou doente ou jogo bola
- d) Jogo bola e estou doente.
- e) Jogo bola e não estou doente

NOÇÕES SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA*Géssica Ehle*

12. Bia, pessoa com deficiência, inscreveu-se em um curso de extensão em Direitos Humanos em uma Faculdade privada de sua cidade, grande evento que se realizaria em um amplo auditório e contava com ampla promoção. Chegada a data da primeira aula, Bia sentou-se junto à plateia e aguardou pelo início das palestras. Já no instante que o primeiro palestrando sobe ao palco, Bia percebe que nenhum intérprete da Libras o acompanhou em suas falas iniciais.

Inquieta com a situação, Bia procura a coordenação do evento a fim de questionar sobre a falta de acessibilidade. Joana, coordenadora do curso, a recebeu com extrema aspereza, respondendo que não havia tradutor algum contratado e indicando que Bia assistisse o evento e se contentasse em poder ali estar, pois pessoas como ela são um fardo para a sociedade.

Diante do que dispõe a Lei n. 13.146/2015, a fala de Joana configurou uma barreira

- a) nas comunicações
- b) urbanística
- c) tecnológica
- d) atitudinal
- e) intergeracional

13. Nos termos do Decreto n. 3.298/1999, que dispunha sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, ainda à luz do paradigma da integração social, assinale a alternativa que apresenta um dos objetivos da mencionada Política.

- a) desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto socioeconômico e cultural

- b) garantia da efetividade dos programas de prevenção, de atendimento especializado e de inclusão social.
- c) respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber igualdade de oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem privilégios ou paternalismos.
- d) ampliar as alternativas de inserção econômica da pessoa portadora de deficiência, proporcionando a ela qualificação profissional e incorporação no mercado de trabalho
- e) o fomento à formação de recursos humanos para adequado e eficiente atendimento da pessoa portadora de deficiência

CÓDIGO DE ÉTICA DO TRT15*Tiago Zanolla*

14. João, servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, trabalha em um setor responsável pela análise de processos administrativos. Em determinada ocasião, um superior hierárquico solicita que ele priorize o andamento de um processo específico, sem justificativa técnica, apenas para atender ao interesse pessoal de um terceiro. Diante dessa situação, de acordo com o Código de Ética do Tribunal, a conduta correta de João deve ser:

- a) Atender ao pedido imediatamente, pois ordens superiores devem ser cumpridas sem questionamentos.
- b) Recusar-se a cumprir a solicitação e denunciá-la à chefia competente.
- c) Cumprir a solicitação desde que isso não cause atraso nos demais processos sob sua responsabilidade.
- d) Solicitar que o pedido seja formalizado por escrito para, então, decidir se irá cumpri-lo ou não.
- e) Pedir autorização aos colegas de trabalho antes de tomar qualquer decisão sobre o caso.

15. Mariana, servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, foi denunciada anonimamente por um colega sob a alegação de que teria acessado e divulgado informações sigilosas sem autorização. A Comissão de Ética instaurou um processo de apuração e notificou Mariana, garantindo-lhe amplo acesso aos autos e a possibilidade de apresentar defesa. No entanto, durante o processo, Mariana soube que informações sobre a denúncia foram divulgadas publicamente, expondo-a indevidamente.

Diante dessa situação, assinale a alternativa correta:

- a) O sigilo do processo deveria ter sido mantido, e a divulgação indevida pode configurar irregularidade.
- b) A Comissão de Ética não tem obrigação de garantir sigilo nos processos, pois o interesse público deve prevalecer.
- c) O acesso aos autos é restrito à Comissão de Ética e ao denunciante, e Mariana só poderia ter acesso à decisão final.
- d) A denúncia anônima não pode fundamentar a instauração do processo, tornando o procedimento irregular.
- e) O Presidente do Tribunal deve, obrigatoriamente, aplicar sanção a Mariana antes da conclusão do processo.

REGIMENTO INTERNO DO TRT15

Tiago Zanolla

16. O Desembargador Carlos identificou a necessidade de incluir um processo na pauta de julgamento do Tribunal Pleno em caráter urgente, pois envolve uma questão relevante e de grande impacto para a jurisdição. No entanto, a pauta já havia sido definida e organizada pelo Secretário, com a aprovação do Presidente do Tribunal.

Diante dessa situação, qual é a conduta correta segundo o Regimento Interno?

- a) O Desembargador pode incluir o processo na pauta, desde que comunique previamente o Presidente do Tribunal.
- b) O Desembargador deve aguardar a inclusão na pauta seguinte, pois não há previsão para inclusão excepcional de processos.
- c) O processo só poderá ser incluído na pauta se houver aprovação unânime de todos os membros do Tribunal Pleno.
- d) O Desembargador pode requerer a apreciação do caso independentemente da pauta, desde que seja reconhecida a urgência e relevância pelo Tribunal Pleno ou Órgão Especial.
- e) O processo poderá ser incluído apenas se houver requerimento formal de todas as partes envolvidas.

17. Durante um julgamento em uma das Câmaras do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, um dos Desembargadores percebe que a tese jurídica que fundamenta sua decisão já está consolidada por Súmula do Tribunal. No entanto, outro Desembargador sugere que a jurisprudência contida na Súmula seja revisada, pois há novos entendimentos que podem levar à sua alteração.

Diante dessa situação, o que pode ser feito segundo o Regimento Interno?

- a) O Desembargador que deseja revisar a jurisprudência pode propor a revisão diretamente ao Tribunal Pleno, sem necessidade de tramitação prévia.
- b) O feito deve ser remetido à Comissão de Jurisprudência se a proposta de revisão for acolhida pelo órgão colegiado competente.
- c) A Súmula não pode ser revisada, pois uma vez aprovada, torna-se definitiva e imutável.
- d) Qualquer desembargador pode cancelar a Súmula unilateralmente, desde que justifique sua decisão.
- e) A Comissão de Jurisprudência não tem competência para sugerir alterações em Súmulas, cabendo essa atribuição exclusivamente ao Presidente do Tribunal.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA*Elisabete Moreira*

18. As organizações formais modernas apresentam características peculiares que devem atender às necessidades estratégicas das organizações. A estrutura linear, criada por Fayol, no início do século XX, constitui-se num dos tipos mais simples de organização e, não obstante ter sido idealizada no início do século XX, ainda possui aplicação nos dias atuais. Acerca desse tipo de estrutura, aponte quais princípios são próprios e aplicados atualmente à estrutura linear:

- a) cadeia escalar, subordinação dos interesses individuais aos gerais, remuneração do pessoal, variedade de comando.
- b) supervisão única, unidade de direção, centralização da autoridade e cadeia escalar.
- c) subordinação dos interesses individuais aos gerais, remuneração do pessoal, estabilidade do pessoal e linhas diretas de comunicação e linhas formais de comunicação.
- d) autoridade e responsabilidade, divisão do trabalho, organicidade e flexibilidade.
- e) remuneração do pessoal, estabilidade do pessoal, centralização da autoridade e foco no lucro e nos resultados.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA*Emannuelle Gouveia*

19. Das letras abaixo, marque a alternativa que descreve a opção que não é exibida no menu propriedades, do Windows Explorer, ao selecionarmos um arquivo.

- a) O tamanho do arquivo.
- b) O local onde ele se encontra armazenado no disco.
- c) A data e a hora da sua criação.
- d) A quantidade de caracteres que o arquivo possui
- e) o nome do arquivo

20. A URL é formada por várias partes. A que indica o domínio vem logo após o (a):

- a) protocolo
- b) caminho
- c) query
- d) elemento
- e) email

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 1***Mirela Barreto*

21. Adolescente, 15 anos de idade, sexo feminino, é trazida ao consultório odontológico pela mãe, após uma queda da própria altura ocorrida na escola, cerca de 30 minutos antes da consulta. Ela relata que perdeu o dente e que, tão logo visualizou o dente no chão, "guardou em um pote com água" e ligou para a mãe levá-la na consulta de emergência. O exame clínico mostra ausência do elemento 21, preenchido por coágulo. Ao exame radiográfico, imagem sugestiva de linha radiolúcida sobre rebordo alveolar dos elementos 11, 21, 22, com mobilidade em bloco no exame clínico. Acerca do protocolo de tratamento na consulta de emergência, deve ser realizado

- a) reimplante imediato, seguido de contenção semirrígida por 7 a 10 dias
- b) reimplante imediato, seguido de contenção rígida de 4 a 8 semanas
- c) lavagem do elemento em soro fisiológico, segurando pela raiz, seguido de contenção semirrígida por 7 a 10 dias
- d) lavagem do elemento com ácido fosfórico removendo as fibras do ligamento periodontal, seguido de contenção rígida de 4 a 8 semanas.
- e) O elemento não deve ser reimplantado e a paciente deve ser encaminhada para consulta com implantodontista.

22. Paciente JSF, 18 anos, procura atendimento odontológico para a confecção de uma prótese fixa no elemento 36, que estava com restauração fraturada extensa. As condições de saúde bucal são boas e o biofilme dental apresenta características favoráveis à manutenção da higidez periodontal e baixo risco de cárie. Ao proceder aos exames clínico e radiográfico, o cirurgião-dentista constata presença de radiopacidade ao redor dos ápices das raízes do elemento 36. Indagada sobre o histórico do dente, sinais e sintomas, a paciente relata já ter sentido dor de baixo grau, mas que não chegou a procurar atendimento na época. Este quadro clínico é compatível com o diagnóstico de

- a) Displasia cemento-óssea
- b) Ceratocisto
- c) Pulpite irreversível
- d) Osteíte condensante
- e) Osteomielite aguda

23. Apesar de ser amplamente utilizado por permitir comparação de dados e metodologia compreendida internacionalmente, o CPO apresenta algumas limitações importantes, EXCETO

- a) não considera os estágios iniciais do processo carioso
- b) perdas dentárias por problemas periodontais ou outras causas não relacionadas à cárie levam a uma superestimação da história passada de cárie
- c) não é considerado como indicativo padrão para decisão de tratamento das lesões de cárie, pois seu componente cariado não remete nem à gravidade, nem à atividade da lesão presente.
- d) Não apresenta faixas etárias específicas, o que não permite comparações ao longo dos anos
- e) Cada dente ou superfície recebe apenas uma classificação;

24. A Fluorose é um sensível indicador de que o desenvolvimento do dente esteve exposto ao flúor. Acerca do índice epidemiológico que avalia a fluorose, analise as alternativas:

- I- O índice recomendado pela OMS é o índice de Dean.
- II- Neste levantamento serão examinadas as idades de 12, 15 a 19 anos.
- III- As lesões fluoróticas são usualmente bilaterais e simétricas e tendem a apresentar estrias horizontais.
- IV- O Escore 2 corresponde ao escore "muito leve", envolvendo não mais que 25% da superfície.

Estão corretas

- a) I e II
- b) I e IV
- c) I, II, III
- d) I, III, IV
- e) I, II, III, IV

O enunciado abaixo se refere às questões **25 e 26**:

25. Todos os anestésicos locais possuem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. Em níveis sanguíneos terapêuticos, não ocorrem efeitos clinicamente significativos no sistema nervoso central. Já em níveis de superdosagem, a manifestação clínica primária que se desenvolve é

- a) angina de peito
- b) arritmia cardíaca.
- c) acidente vascular encefálico
- d) depressão respiratória
- e) a convulsão tônico-clônica generalizada.

26. Na situação descrita a conduta do dentista frente ao caso de superdosagem em níveis elevados deve ser

- a) posicionar o paciente numa posição confortável (semi-inclinada), e se houver diminuição da Pressão arterial e da Frequência Cardíaca, deve deitar o paciente de costas (em posição supina) com as pernas ligeiramente mais elevadas que a cabeça.
- b) Afrouxar as roupas da paciente e afastar objetos perfurocortantes.
- c) Encaminhar a paciente ao médico.
- d) Chamar o SAMU
- e) Colocar a paciente em posição sentada.

27. Paciente com 52 anos de idade, sexo feminino, tem indicação para extração do dente 37 devido cárie radicular extensa. Na anamnese, a paciente relata ter fobia de dentista e ter muito medo de realizar cirurgia. O exame clínico mostra restauração de resina nas faces ocluso-mesial do dente 37, com acúmulo de placa e o exame radiográfico mostra raízes divergentes e área radiolúcida na raiz mesial. Acerca do controle farmacológico da ansiedade com uso de benzodiazepínicos pode-se afirmar que

- I- Os benzodiazepínicos facilitam a ação do ácido gama-aminobutírico (GABA), que induz à abertura dos canais de cloreto da membrana de neurônios, resultando na diminuição da excitabilidade e na propagação de impulsos excitatórios.
- II- A escolha principal do fármaco recai sobre o Lorazepam.
- III- Pode ser utilizado o Midazolam e o Diazepam, nas dosagens respectivas de 7,5 a 15 mg e 1 a 2 mg.
- IV- Em caso de administração do Diazepam, deve ser feita 1 hora antes da consulta.

Estão corretas

- a) I, II, III
- b) II, III, IV
- c) I e IV

- d) I, III, IV
- e) III, IV

28. A glosa é o cancelamento ou recusa parcial ou total de uma fatura apresentada pelo prestador de serviços diante de uma não conformidade do serviço prestado. Na prática, as glosas odontológicas representam o não pagamento, por parte das operadoras de planos odontológicos, de valores referentes à prestação de serviços pelos Cirurgiões-dentistas credenciados. A glosa relacionada ao tratamento realizado, que pode ser considerado desejável, aceitável ou inaceitável trata-se da

- a) Glosa Administrativa
- b) Glosa técnica
- c) Glosa Pericial
- d) Glosa por quebra de contrato
- e) Glosa incapacitante

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 2

Stefania Possamai

29. Paciente com 22 anos de idade, sexo feminino, chega ao consultório relatando dor na gengiva. Na anamnese, a paciente não refere ter qualquer doença sistêmica, porém diz estar enfrentando situações de "estresse" devido aos preparativos para os exames vestibulares. O exame clínico mostra áreas necróticas cobertas por pseudomembrana, a sondagem periodontal mostra perda de inserção clínica de 7 mm nos dentes 16,17,26 e 27. O quadro clínico é compatível com o diagnóstico de:

- a) Periodontite agressiva localizada.
- b) Periodontite agressiva generalizada.
- c) Gengivite necrosante.
- d) Periodontite necrosante.
- e) Periodontite crônica generalizada.

30. O quadro clínico é compatível com o diagnóstico de

- a) abscesso gengival.
- b) Abscesso periodontal.
- c) Gengivite necrosante
- d) gengivoestomatite herpética aguda
- e) periodontite estágio III, grau 2.

31. O tratamento proposto para o caso é:

- a) raspagem e alisamento radicular
- b) antibiótico sistêmico e reavaliação
- c) drenagem do abcesso através do sulco ou ponto de flutuação
- d) curetagem do tecido gengival
- e) somente utilizar antibiótico sistêmico

32. A microbiota dos abcessos é polimicrobiana e dominada por espécies não móveis, gram-negativas, anaeróbias estritas e em forma de bastonetes. Entre os patógenos abaixo, assinale aquele que apresenta a maior virulência nos casos de abcessos.

- a) Prevotella intermedia
- b) Prevotella melaninogenica
- c) Fusobacterium nucleatum
- d) Porphyromonas gingivalis
- e) Aggregatibacter actinomycetemcomitans

33. Paciente de 52 anos, gênero feminino refere ter diabetes melito tipo II, sua avaliação mais recente da dosagem de hemoglobina A1c obtida há 2 meses foi de 7,9%. As radiografias demonstram vários dentes com perda óssea que se estende além do terço coronário do comprimento da raiz. Ademais, observa-se perda de inserção interproximal entre 5 e 6mm em 12 dentes. De acordo com a Classificação das doenças e condições periodontais, 2018, o diagnóstico da paciente é:

- a) Estágio II, grau A. localizada

b) Estágio II, grau B, generalizada

c) Estágio III, grau B, localizada

d) Estágio III, grau C, generalizada

e) Estágio IV, grau C, generalizada

34. A respeito do diabetes melitus (DM) e a doença periodontal, assinale a alternativa incorreta.

- a) Um achado característico de pacientes diabéticos descompensados é a presença de múltiplos abcessos.
- b) A hiperglicemia nos diabéticos modula a razão RANKL:OPG nos tecidos periodontais e, assim, contribui para a destruição do osso alveolar
- c) Estudos em animais demonstram que o reparo ósseo é significativamente limitado pelo DM, e o nível de apoptose das células do revestimento ósseo é diminuído.
- d) Os indivíduos diabéticos desenvolveram inflamação gengival acelerada e exacerbada em comparação com o grupo-controle sem DM, apesar de ameaça bacteriana semelhante.
- e) O DM descompensado demonstra efeitos sobre outros tipos de células relevantes, tais como a diminuição na produção de colágeno e o aumento da atividade colagenolítica pelos fibroblastos da gengiva e do ligamento periodontal

35. Considere a necessidade de raspagem subgengival dos dentes posteriores superiores e inferiores. Quais as curetas indicadas para raspagem de todas as faces que serão utilizadas no procedimento:

- a) Gracey 11-12 e Mcall 3-4
- b) Gracey 3-4 e Mcall 17-18
- c) Gracey 7-8, e Mcall 11-12 e 13-14
- d) Gracey 7-8, 11-12 e 13-14.
- e) Mcall 7-8,11-12 e 13-14.

36. Assinale a alternativa que contém apenas patógenos do complexo vermelho de Socransky

- a) *T. forsythia, T. denticola e P. gingivalis*
- b) *P. gingivalis, P. intermedia, Prevotella nigrescens*
- c) *P. gingivalis, C. rectus, Parvimonas micra*
- d) *T. forsythia, C. rectus, Parvimonas micra*
- e) *T. denticola, Eucabterium nodatum, , C. rectus*

causando reabsorção radicular de um dente adjacente.

- d) O tratamento mais comum para o cisto dentígero é a enucleação cuidadosa do cisto junto com a remoção do dente não erupcionado
- e) Cistos dentígeros ocorrem apenas ao redor de terceiros molares inferiores impactados.

39. Paciente sexo feminino, 33 anos, gestante no segundo trimestre, refere perda repentina do controle muscular em um dos lados da face, resultando em uma aparência semelhante a uma máscara rígida e na incapacidade de sorrir, fechar o olho, piscar ou levantar a sobrancelha. Ao procurar atendimento médico, a paciente não referiu vertigem ou zumbido no ouvido. Ao preencher a anamnese o médico deve considerar, pelo trimestre de gestação, que a gestante enquadra-se em qual categoria da Classificação ASA?

- a) ASA I
- b) ASA II
- c) ASA III
- d) ASA IV
- e) ASA V

40. Paciente, sexo feminino, 52 anos, durante a anamnese relata a sensação de choque elétrico, na dobra nasolabial, após escovar os dentes. O diagnóstico foi de nevralgia do trigêmeo e o tratamento inicial para a condição foi medicamentoso, tendo a _____ como a primeira droga de escolha.

- a) Carbamazepina
- b) Fenitoína
- c) Dilantina
- d) Aspirina
- e) Varfarina

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 3

Cássia Reginato

37. Sobre o câncer bucal, assinale a alternativa incorreta:

- a) O tabagismo e o consumo excessivo de álcool são fatores de risco bem estabelecidos para o desenvolvimento do câncer bucal.
- b) O câncer bucal pode se manifestar em diversas formas, incluindo lesões ulcerativas e placas brancas ou vermelhas.
- c) A detecção precoce do câncer bucal tem impacto significativo nas taxas de sobrevivência dos pacientes.
- d) A infecção pelo vírus HPV é um fator de risco associado ao câncer bucal, especialmente em casos de carcinoma orofaríngeo.
- e) Para os pacientes que param de fumar, o risco de desenvolver câncer bucal é similar à dos indivíduos fumantes.

38. Sobre os cistos dentígeros, assinale a alternativa incorreta:

- a) Cisto folicular é considerado sinônimo de cisto dentígero.
- b) As lesões de grandes proporções podem causar expansão óssea na região acometida.
- c) Os cistos dentígeros podem deslocar o dente acometido, alcançando distâncias consideráveis e

41. Paciente 60 anos, sexo feminino, relata possuir artrite reumatoide. Procurou atendimento odontológico relatando sensação de boca seca, dificuldades durante a deglutição e para usar a prótese removível. Ao exame clínico foi observada mucosa oral vermelha e dolorida na região de comissuras labiais e presença de cáries cervicais. Sobre as lesões na região de comissura, o diagnóstico provisório pode ser de:

- a) Síndrome da Ardência bucal
- b) Síndrome de Sjogren
- c) Queilite actínica
- d) Queilite angular
- e) Anemia ferropriva.

42. Paciente sexo feminino, 55 anos procura atendimento para avaliação de várias vesículas faciais com formação de crosta que se estendem para a linha média. Durante a anamnese, quando perguntada sobre a história médica pregressa, relatou ter tido na infância uma doença com aspecto de “uma gota de orvalho em uma pétala de rosa”. Acredita-se que a paciente apresente uma reativação do vírus _____, com o envolvimento do ramo do nervo sensitivo afetado. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:

- a) VZV
- b) HSV
- c) EBV
- d) CMV
- e) KSHV

43. Erosão consiste na perda da estrutura dentária causada por um processo químico não bacteriano. A fonte de ácidos geralmente é encontrada nos alimentos e bebidas, mas outras fontes incluem algumas medicações (p.ex., vitamina C mastigável, pastilhas de aspirina), piscinas com monitoramento de pH deficiente, regurgitação involuntária crônica (p.ex., hérnia de hiato, esofagite, alcoolismo crônico e gestação), regurgitação voluntária (p.ex., distúrbios psicológicos, bulimia e ocupações que requerem baixo peso corporal) e exposição ambiental industrial. Sobre a deficiência de ácido ascórbico, assinale a alternativa incorreta.

- a) A deficiência é conhecida como escorbuto
- b) Os sinais clínicos do escorbuto estão relacionados à síntese inadequada de colágeno
- c) Os pacientes tendem a apresentar retardos na cicatrização de feridas,
- d) As manifestações orais diminuição da gravidade da infecção periodontal e perda óssea
- e) Os pacientes podem apresentar hemorragia espontânea.

44. O consumo excessivo de açúcar extrínseco é causa comum de várias doenças crônicas, como cárie dentária, diabetes, doenças cardiovasculares e obesidade, razão pela qual a OMS recomenda que sua ingestão não represente mais do que 10% das calorias ingeridas diariamente. Um cirurgião-dentista que necessite realizar uma cirurgia em paciente portador de diabetes melito pode obter o controle metabólico a partir de qual exame?

- a) glicemia aleatória
- b) Glicemia em jejum
- c) Hemoglobina glicada
- d) Glicemia casual
- e) Teste capilar

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 4*Larissa Oliveira*

45. As dores orofaciais podem ser classificadas de acordo com a qualidade, comportamento temporal, duração, localização, formas do curso e intensidade. Uma dor definida como espalhada é aquela que

- a) Apresenta exacerbação momentânea.
- b) Apresenta-se certa forma vaga e anatomicamente variável.
- c) Mudam rapidamente de lugar.
- d) Apresenta mudanças mais graduais da localização.
- e) Apresenta o envolvimento de áreas anatômicas adjacentes.

46. Os determinantes da oclusão dentária influenciam diretamente a dinâmica mandibular e a morfologia oclusal. Considerando a interação entre os determinantes anteriores e posteriores da oclusão, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A guia anterior e a curva de Spee são exemplos de determinantes anteriores da oclusão, sendo diretamente influenciadas pela morfologia dentária.
 - II. O ângulo da eminência articular influencia a trajetória condilar e, consequentemente, a inclinação das cúspides dos dentes posteriores.
 - III. A distância intercondilar e o ângulo de Bennett são determinantes posteriores fixos, podendo ser modificados por meio de ajustes oclusais seletivos.
 - IV. A inclinação da guia anterior pode compensar uma guia condilar mais plana, aumentando a disclusão posterior durante movimentos excursivos da mandíbula.
- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 - b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
 - c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
 - d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
 - e) Todas as afirmativas estão corretas.

47. Embora possa haver grande variação na expressão dos sintomas de DTM, normalmente esta se apresenta na forma de dor na região orofacial, e os pacientes referem este quadro doloroso nas regiões da cabeça, do ouvido e da face, predominantemente. Avalie as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

- I. Quando há limitação de movimentos, pode ter ocorrido comprometimento muscular e/ ou articular, impedindo a movimentação mandibular. Mais frequentemente, a limitação de movimento ocorre em função de obstáculo mecânico ao movimento pode ser mecânico.
 - II. Os quadros mais prevalentes de dor causados por DTM são aqueles que envolvem condições inflamatórias da musculatura mastigatória. A inflamação muscular, por sua vez, pode ser decorrente de traumas mecânicos (um impacto no músculo, como uma cotovelada, por exemplo) ou, mais comumente, por hiperatividade muscular (função muscular exagerada, acima daquele que ocorre durante a função normal).
 - III. Normalmente a hiperatividade muscular dos músculos pterigoideos laterais pode causar alterações do posicionamento do disco articular, com deslocamento no sentido da tração, ou seja, para lateral e para anterior.
- a) I, II e III estão corretas.
 - b) Apenas I e II corretas.
 - c) Apenas II está correta.
 - d) Apenas I e III corretas.
 - e) Todas incorretas.

48. As placas oclusais são uma das formas de terapia mais empregadas para o tratamento das DTM's de origem muscular e, muitas vezes, também das DTM's intra-articulares. Sobre as placas oclusais, assinale a alternativa correta.

- a) As placas oclusais oferecem algumas vantagens que explicam seu uso clínico, como: melhora da sintomatologia dolorosa em grande parte dos casos, não invasivas, reversíveis, permitem sua utilização como recurso diagnóstico, custo acessível e técnica simples.
- b) As placas oclusais podem ser parciais ou totais. Os dois tipos não oferecem estabilidade à mandíbula, devendo ser utilizadas por espaços curtos de tempo (15 dias).
- c) As placas oclusais totais podem ser confeccionadas somente para o arco superior.
- d) Uma desvantagem das placas oclusais é que elas não podem ser confeccionadas para pacientes usuários de próteses removíveis.
- e) O uso das placas oclusais é contraindicado em casos crônicos ou nos quais os fatores etiológicos não puderam ser totalmente controlados.

49. Sobre interpretação radiográfica, assinale a alternativa correta.

- a) O alvéolo dentário é limitado por uma fina camada radiopaca de osso denso, a lâmina dura. Essa camada é contínua com a sombra da cortical óssea na crista alveolar. Ela é ligeiramente mais densa e mais mineralizada que as trabéculas do osso medular da região.
- b) As fraturas radiculares são facilmente identificadas quando se localizam longitudinalmente ao longo eixo do dente.
- c) O forame incisivo na maxila é a saída na cavidade oral do canal nasolacrimal.
- d) O processo coronoide pode ser visto em radiografias de molares superiores e apresenta trabeculagem intensa.

e) Em condições de normalidade, a imagem radiográfica do cimento é imperceptível, dada a semelhança da radiopacidade com a dentina e a pouca espessura das suas camadas. Sua presença se faz notar nos casos de hiper cementose.

50. A imagem digital é uma imagem convertida em números. Resulta da conversão de um sinal analógico para um sinal digital. Assinale a alternativa incorreta.

- a) Nas radiografias digitais, a unidade de informação se chama pixel. O tamanho do pixel determina a resolução da imagem. Quanto maior, melhor a resolução e mais detalhes serão observados.
- b) A resolução espacial refere-se ao número de pixels em que a imagem digital está dividida. A resolução espacial se dá em pares de linha/milímetro, quanto maior o número de linhas, melhor a resolução.
- c) Alto custo e menor área de abrangência são desvantagens dos sistemas digitais de radiografia digital odontológica.
- d) Os métodos digitais diretos apresentam dois sistemas de captura de imagem: CCD e placas de fósforo.
- e) O sistema de CCD tem uma vida útil maior, pois a placa de fósforo sofre degradação mecânica, enquanto a placa de fósforo oferece maior facilidade de posicionamento, pois não necessita de nenhum tipo de fio ou cabo para conexão ao sistema, o que é uma das grandes desvantagens que encontramos nos aparelhos CCD.

51. Durante a remoção cirúrgica de um terceiro molar inferior incluso, o cirurgião-dentista deve atentar-se a diversos fatores para garantir uma abordagem segura e eficaz. A escolha da técnica cirúrgica depende de múltiplos aspectos anatômicos, como a posição do dente, a relação com o segundo molar e a proximidade com estruturas nobres, como o canal mandibular. Além disso, a manipulação inadequada dos tecidos moles pode levar a complicações como deiscência de sutura e formação de comunicação ororantral. Em casos de impacção profunda, o uso de osteotomia e odontosecção pode ser necessário para minimizar o trauma cirúrgico e preservar a integridade óssea. Diante disso, com base nos princípios de cirurgia, assinale a alternativa que indica a conduta mais adequada para um terceiro molar inferior incluso, em posição horizontal e com contato íntimo com o canal mandibular:

- a) Deve-se evitar a osteotomia, pois a integridade óssea é fundamental para a manutenção da estabilidade mandibular, realizando-se a luxação direta do dente com alavancas.
- b) A extração deve ser realizada sem odontosecção para evitar fragmentação da raiz e possíveis complicações pós-operatórias, como parestesia do nervo alveolar inferior.
- c) A remoção do dente deve ser precedida de um planejamento cirúrgico detalhado, com avaliação radiográfica e tomográfica, utilizando osteotomia cuidadosa e odontosecção para reduzir o risco de lesão ao nervo alveolar inferior.
- d) A incisão deve ser realizada o mais próxima possível da coroa do dente para facilitar o acesso e minimizar a exposição óssea, garantindo menor tempo cirúrgico.
- e) Em casos de contato próximo com o canal mandibular, a conduta mais indicada é aguardar a erupção espontânea do dente, evitando assim possíveis danos neurológicos.

52. A anticoagulação terapêutica é realizada em pacientes com implantes trombogênicos como próteses de válvulas cardíacas; com problemas cardiovasculares trombogênicos como fibrilação atrial ou após infarto do miocárdio; ou com a necessidade de fluxo sanguíneo extracorpóreo como por hemodiálise. Assinale a alternativa incorreta.

- a) Ainda que utilizada em baixas dose, a aspirina deve ser retirada para permitir cirurgias de rotina.
- b) Pacientes que tomam heparina normalmente podem ter suas cirurgias adiadas até que a heparina circulante esteja inativa (6 horas, se é dada a heparina IV; 24 horas, se dada de forma subcutânea).
- c) Em pacientes que usam Warfarina e apresentam INR maior que 3, a medicação deve ser suspensa dois ou três dias antes da cirurgia planejada. Na manhã da cirurgia, o valor do INR deve ser checado; se ele estiver entre dois e três INR, a cirurgia bucal habitual pode ser realizada. Se o TP ainda estiver maior que 3 INR, a cirurgia deve ser adiada até que o TP se aproxime de 3 INR.
- d) Em paciente que usam heparina, o médico do paciente deve ser consultado para determinar se é seguro interromper o uso da heparina no período transoperatório.
- e) Devem ser tomadas medidas extras durante e após a cirurgia para ajudar a promover a formação e retenção de coágulos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 5*Renata Barbosa*

53. Paciente de 16 anos de idade, sexo masculino, tem a queixa principal de "dor esporádica em um dente inferior atrás". A sintomatologia dolorosa é provocada pelo ao se alimentar. O paciente apresenta pobre higiene oral, placa e manchas brancas. O exame clínico mostra lesões cavitadas nos dentes 36, 37 e 46, mas sem fístula ou abscesso. O exame radiográfico indica não haver exposição pulpar. A conduta para atendimento atraumático desses elementos consiste em remoção:

- a) completa de dentina terciária com brocas esféricas e inserção de cimento de óxido de zinco e eugenol.
- b) parcial de dentina infectada com curetas e inserção de cimento de ionômero de vidro.
- c) parcial de dentina terciária com brocas esféricas e inserção de cimento de óxido de zinco e eugenol.
- d) completa de dentina afetada com curetas e inserção de cimento de ionômero de vidro.
- e) parcial da dentina infectada e afetada com brocas esféricas e inserção de cimento de ionômero de vidro.

54. Para responder à questão, considere as informações abaixo.

Após o preparo cavitário do dente 26 de paciente com 19 anos de idade, sexo feminino, a dentina remanescente tem espessura de 2,5mm em relação a parede de fundo. Considerando em realizar uma restauração estética, a proteção do complexo dentinopulpal para a restauração desse dente é:

- a) indicada quando se utiliza o verniz cavitário como material selador.
- b) desnecessária quando se utiliza o cimento de óxido de zinco e eugenol como material restaurador provisório.
- c) desnecessária quando se utiliza o cimento de ionômero de vidro como forrador.
- d) desnecessária quando se usa o adesivo dentinário como material selador.
- e) indicada quando se tem o cimento de hidróxido de cálcio à disposição para forramento.

55. Paciente com 31 anos de idade, sexo masculino, relata "sensibilidade" durante a escovação e quando "bebe seus energéticos". O exame clínico mostra recessão gengival na região vestibular de dentes superiores e perda de brilho nas palatinas do arco. Ao teste térmico e tátil confirma o diagnóstico de hipersensibilidade dentinária sem perda evidente de estrutura dentária.

O cirurgião-dentista deve buscar algumas informações para auxiliar na condução do tratamento do paciente, como:

- I. tipo de creme dental utilizado
 - II. frequência das bebidas
 - III. consumo de alimentos contendo sacarose
 - IV. mordiscar canetas ou outros objetos rígidos
- a) I e II
 - b) I e III
 - c) II e III
 - d) I e IV
 - e) II e IV

56. RPS, 23 anos, sexo feminino, procurou uma UBS pois notou uma cárie próxima ao dente superior restaurado. Após remoção da restauração deficiente e isolamento, durante o preparo cavitário do dente 25 ocorreu exposição pulpar acidental. Qual é a propriedade do material que deve ser utilizado na restauração do elemento:

- a) Deve ser um material bactericida e ou bacteriostático, altamente solúvel.
- b) Deve ser um material com pH ácido e propriedades neurotóxicas.
- c) Deve ser um material que não estimula a formação de dentina reacional.
- d) Deve ser um material que não apresenta biocompatibilidade.
- e) Deve ter propriedades antimicrobianas e pH alcalino, estimulando a formação de dentina secundária.

Para responder à questão **57** e **58**, considere as informações abaixo.

Paciente com 32 anos de idade, sexo feminino, apresenta restaurações Classe II em amálgama nos dentes 16, 26, 36 e 46. A paciente solicita a substituição das restaurações “antigas” por restaurações novas.

57. Para responder à questão, considere as informações abaixo. O exame intraoral das restaurações deve detectar a presença de

- I. alto grau de corrosão na superfície da restauração.
 - II. presença de cárie secundária
 - III presença de fratura do corpo do amálgama
 - IV. presença de leve creep ou fluênciá nas bordas da restauração
- a) I e II
 - b) I e III
 - c) I e IV
 - d) III e IV
 - e) II e III

58. Caso seja necessário um reparo, sugere-se alguns procedimentos clínicos para tratamento de superfície com objetivo de maximizar a retenção na restauração insatisfatória do dente que incluem

- a) Esse reparo pode ser executado pela simples adição de mais material plástico.
- b) O reparo não exige a realização de um preparo retentivo na região onde houve o desgaste excessivo.
- c) deve-se realizar a asperização com broca carbide como forma de tratamento prévio.
- d) A aplicação de um adesivo entre o amálgama antigo e o recém-condensado tem vantagem potencial.
- e) O microjateamento com óxido de alumínio é a melhor forma de tratamento do amálgama a ser reparado.

59. De acordo com as novas diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal conforme a Lei nº 14.572, de 8 de maio de 2023, o que deve ser assegurado em relação às ações de saúde bucal?

- a) Acesso universal e equânime a serviços de saúde bucal
- b) Limitação do acesso a serviços de saúde bucal para pessoas de alta renda
- c) Foco prioritário em saúde bucal infantil e do idoso.
- d) Exclusão de grupos vulneráveis nas ações de reabilitação.
- e) Acesso preferencial a serviços odontológicos para grupos vulneráveis e prioritários.

60. Considere as assertivas a seguir com relação aos resultados do SB Brasil 2023 sobre edentulismo:

- I. A inclusão da oferta de próteses dentárias no SUS foi uma resposta à perda dentária entre adultos e idosos
- II. a necessidade de prótese permanece alta, indicando que a oferta de reabilitação por prótese dentária precisa ser ampliada nos serviços
- a) As assertivas I e II são corretas e a assertiva II não justifica a assertiva I.
 - b) A assertiva I e II são corretas e a assertiva II justifica a assertiva I.
 - c) A assertiva I é correta, mas a assertiva II é incorreta.
 - d) As assertivas I e II são incorretas.
 - e) A assertiva I é incorreta, mas a assertiva II é correta.

O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.

Sua opinião é muito importante para nós!

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<http://estrategi.ac/assinaturas>

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<http://estrategi.ac/ok1zt0>