



# SIMULADO ESPECIAL PM RS

OFICIAL DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR -  
CIRURGIÃO DENTISTA - PÓS-EDITAL

# Simulado

Simulado PM-RS (Oficial de Saúde da Brigada Militar - Cirurgia Dentista)

Nome: \_\_\_\_\_

## INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

- 1 - Este simulado conta com questões focadas no concurso **PM-RS**, cargo de **Oficial de Saúde da Brigada Militar - Cirurgia Dentista**;
- 2 - A prova contém itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso;
- 3 - As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora;
- 4 - Os participantes têm das **8:00h** às **13:30h** para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico;
- 5 - O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado logo após estas instruções;

## PREENCHA SEU GABARITO

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para preencher seu gabarito.

<https://forms.gle/U7ccXReJJTW6KwUY8>

|                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 - A B C D E | 16 - A B C D E | 31 - A B C D E | 46 - A B C D E | 61 - A B C D E |
| 02 - A B C D E | 17 - A B C D E | 32 - A B C D E | 47 - A B C D E | 62 - A B C D E |
| 03 - A B C D E | 18 - A B C D E | 33 - A B C D E | 48 - A B C D E | 63 - A B C D E |
| 04 - A B C D E | 19 - A B C D E | 34 - A B C D E | 49 - A B C D E | 64 - A B C D E |
| 05 - A B C D E | 20 - A B C D E | 35 - A B C D E | 50 - A B C D E | 65 - A B C D E |
| 06 - A B C D E | 21 - A B C D E | 36 - A B C D E | 51 - A B C D E | 66 - A B C D E |
| 07 - A B C D E | 22 - A B C D E | 37 - A B C D E | 52 - A B C D E | 67 - A B C D E |
| 08 - A B C D E | 23 - A B C D E | 38 - A B C D E | 53 - A B C D E | 68 - A B C D E |
| 09 - A B C D E | 24 - A B C D E | 39 - A B C D E | 54 - A B C D E | 69 - A B C D E |
| 10 - A B C D E | 25 - A B C D E | 40 - A B C D E | 55 - A B C D E | 70 - A B C D E |
| 11 - A B C D E | 26 - A B C D E | 41 - A B C D E | 56 - A B C D E | 71 - A B C D E |
| 12 - A B C D E | 27 - A B C D E | 42 - A B C D E | 57 - A B C D E | 72 - A B C D E |
| 13 - A B C D E | 28 - A B C D E | 43 - A B C D E | 58 - A B C D E | 73 - A B C D E |
| 14 - A B C D E | 29 - A B C D E | 44 - A B C D E | 59 - A B C D E | 74 - A B C D E |
| 15 - A B C D E | 30 - A B C D E | 45 - A B C D E | 60 - A B C D E | 75 - A B C D E |

## SIMULADO NO SISTEMA DE QUESTÕES

Clique no link, ou copie e cole no seu navegador, para fazer este simulado também no SQ!

<https://coruja.page.link/M5Fw>

**CONHECIMENTOS GERAIS***Leandro Signori*

1. Considerando a grande diversidade ambiental do Rio Grande do Sul em seus diversos aspectos, tais como clima, rede hidrográfica, relevo e ecossistemas, assinale a afirmativa correta:

- a) O clima predominante no Rio Grande do Sul é tropical úmido, caracterizado por temperaturas amenas e chuvas frequentes durante todo o ano.
- b) A Mata dos Pinhais ocorre na porção Norte e Oeste do Planalto Meridional, em áreas próximas ao estado de Santa Catarina, em altitudes mais elevadas onde o inverno é bastante rigoroso.
- c) O Pampa é uma região de relevo suave ondulado, com altitudes médias variando de 200 a 500 metros e grande diversidade de espécies arbóreas, como araucárias e pinheiros.
- d) O Rio Grande do Sul apresenta quatro grandes compartimentos do relevo, sendo o mais extenso deles a Depressão Central, onde ocorrem alguns dos principais afloramentos carboníferos do estado e do país.
- e) A bacia hidrográfica litorânea apresenta as piores condições ambientais dentre as três bacias, por concentrar grande parte da população e das atividades industriais do estado.

2. A economia do Rio Grande do Sul é bastante diversificada e conta com importante participação dos três setores da economia. Segundo o último balanço divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), no ano de 2021, o estado apresentava o quarto maior Produto Interno Bruto (PIB) do país.

A respeito das características econômicas do estado, analise as afirmativas a seguir:

- I - O Rio Grande do Sul conta com uma importante presença de fontes de energia alternativas, renováveis e não poluentes. Quando se considera a geração de energia elétrica do estado, a fonte com a maior capacidade de geração é a hidroelétrica.
- II - Quando se considera o transporte de cargas e passageiros realizado no estado, é amplo o predomínio do transporte rodoviário sobre os demais modais.
- III - O estado apresenta uma indústria diversificada que se desenvolveu a partir das agroindústrias e de outros segmentos ligados ao setor primário, fazendo com que o setor industrial seja o de maior participação no Produto Interno Bruto (PIB) estadual.

Estão corretas as afirmativas:

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) I e II.
- e) II e III.

3. De modo geral, o termo "urbanização" se refere ao processo pelo qual a população urbana de uma determinada localidade cresce em um ritmo mais acelerado que o da população rural.

Portanto, a urbanização consiste no processo de transformação de uma determinada localidade de rural para urbana. No caso de um país, estado, ou município de rural para urbano. Dessa maneira, uma sociedade é considerada urbana quando a população das cidades supera a população rural.

Com base no processo histórico de urbanização do Rio Grande do Sul e suas tendências recentes, assinale a alternativa correta:

- a) Acompanhou a tendência brasileira, com a população urbana superando a rural na década de 1960, principalmente devido aos processos de industrialização e de êxodo rural.
- b) O estado apresenta quatro regiões metropolitanas, sendo a Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) a com maior população e participação econômica.
- c) Foi um fenômeno desconcentrado no espaço, com as migrações se espalhando por todo o território gaúcho, evitando a concentração em áreas específicas.
- d) As taxas de urbanização no Rio Grande do Sul são uniformemente distribuídas entre todas as regiões, com pouca variação entre os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDES).
- e) Apresentou uma diminuição populacional em todas as cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre entre 2010 e 2022.

4. A respeito das transformações da globalização na ordem política e mundial, assinale a alternativa correta:

- a) A integração dos mercados, por meio dos blocos econômicos, é uma clara contestação dos países à globalização, recusando-se a exercer atividades comerciais com aqueles que não participam do seu bloco econômico.

b) A difusão de grandes empresas transnacionais e a divisão de suas atividades econômicas para qualquer parte da Terra deve-se sobretudo ao avanço das tecnologias de informação, comunicação e de transportes, oriundas em grande parte da Revolução Técnico-Científico-Informacional.

c) A fragmentação das grandes corporações transnacionais em várias pequenas empresas aponta para o iminente fim dos Estados nacionais e para uma economia totalmente descentralizada, favorecida pelo contínuo avanço e valorização das moedas digitais, como o Bitcoin.

d) As mudanças provocadas pela globalização não expressam as relações de poder entre as nações, tornando-a um processo democrático e justo.

e) O fim de milhares de empregos e os problemas ambientais globais mostram o lado negativo e perverso da globalização, que só podem ser resolvidos revertendo esse processo ainda em curso.

5. A 4ª Revolução Industrial, também conhecida como Indústria 4.0, tem transformado profundamente a sociedade contemporânea por meio da convergência de tecnologias físicas, digitais e biológicas. Sobre as características e os impactos dessa revolução, analise a alternativa correta:

- a) A Indústria 4.0 restringe-se ao uso de robôs na manufatura, sem grandes implicações na área da saúde ou no mercado financeiro.
- b) A Internet das Coisas (IoT) promove a conexão de dispositivos à internet, possibilitando automação e eficiência em diversas atividades cotidianas.
- c) A precarização do trabalho não está relacionada às novas tecnologias, mas apenas à crise econômica mundial e ao aumento do desemprego tradicional.
- d) O Big Data refere-se à produção de impressoras 3D que permitem criar objetos personalizados em escala industrial.
- e) As moedas digitais, como o Bitcoin, são emitidas exclusivamente por bancos centrais nacionais, visando substituir o dinheiro em papel.



**PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE  
BUCAL***Renata Barbosa*

6. A filosofia aplicada à promoção de saúde bucal propõe:

- a) Concentrar os esforços em tratamentos odontológicos curativos e individuais.
- b) Desconsiderar a influência das políticas públicas e dos ambientes na saúde bucal.
- c) Isentar a comunidade de participação ativa nas ações de saúde bucal.
- d) Desenvolver habilidades pessoais, fortalecer a ação comunitária e reorientar os serviços de saúde.
- e) Manter o foco exclusivo na atuação dos profissionais de saúde bucal.

7. O que implica o pressuposto de "Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por meio de indicadores adequados"?

- a) Realizar apenas estudos da população adstrita.
- b) Utilizar apenas os sistemas de informações das unidades de saúde.
- c) A existência de registros fáceis, confiáveis e contínuos nos sistemas de informações.
- d) Não padronizar os registros.
- e) Não utilizar indicadores.

8. Em relação às ações de educação em saúde direcionadas a grupos específicos na Atenção Primária, assinale a alternativa correta:

- a) Em grupos de gestantes, a abordagem sobre a saúde bucal deve focar exclusivamente nos cuidados com a higiene da gestante, desconsiderando a saúde bucal do bebê.
- b) Em grupos de bebês, o aleitamento materno exclusivo deve ser desencorajado, pois é considerado um fator de risco para cárie.
- c) Em grupos de adolescentes, orientações sobre o uso de aparelhos ortodônticos e "piercings" são relevantes.
- d) Em grupos de adultos e idosos, alterações do paladar e do fluxo salivar não são temas relevantes para discussão.
- e) Em grupos de cuidadores, a habilidade funcional da pessoa acamada ou idosa não precisa ser considerada, priorizando apenas a técnica de higiene bucal.

9. Qual o objetivo da política de educação permanente para os trabalhadores em saúde bucal?

- a) Instituir propostas de mudança na formação da graduação para futuro atendimento à população.
- b) Implementar projetos de mudança na formação técnica, de graduação e pós-graduação para que atendam às necessidades da população e aos princípios do SUS.
- c) Realizar pesquisas de saúde bucal, notadamente inquéritos populacionais epidemiológicos, promovendo desenvolvimento da ciência e tecnologia nesse campo.
- d) Não envolver a formação técnica, focando em profissionais de nível superior.
- e) Manter a formação tradicional e com foco apenas na pós-graduação de trabalhadores do SUS.

**10.** Sobre a inserção da saúde bucal no SUS, é correto afirmar que:

- a) A inclusão das equipes de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família (ESF) ocorreu de forma imediata e abrangente desde a criação do SUS.
- b) O Programa Brasil Sorridente, lançado em 2000, estabeleceu a desvinculação da saúde bucal dos demais níveis de atenção do SUS.
- c) As equipes de Saúde Bucal (eSB) atuam de forma isolada das equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Primária (eAP), mantendo sua gestão e processo de trabalho independentes.
- d) A Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) preconiza a interdisciplinaridade e o multiprofissionalismo como elementos importantes para a integralidade da atenção.
- e) A modalidade prioritária para a oferta e expansão da atenção em saúde bucal na Atenção Primária à Saúde (APS) é a eSB com carga horária diferenciada (CHD) de 20 ou 30 horas.

**11.** Sobre as atividades coletivas em saúde bucal no SUS, assinale a alternativa correta:

- a) As atividades coletivas devem ser realizadas exclusivamente pelo Cirurgião-Dentista (CD) para garantir a qualidade técnica.
- b) As ações de educação em saúde podem ser realizadas apenas dentro da Unidade de Saúde, utilizando o tempo de espera dos usuários.
- c) Os grupos operativos para ações educativas nas UBS devem ser constituídos por, no mínimo, 5 pessoas, com duração mínima de 15 minutos.
- d) As ações de saúde bucal devem focar apenas em pacientes sem doenças crônicas, para otimizar o tempo.
- e) Os procedimentos coletivos constituem o conjunto de procedimentos de educação em saúde e prevenção em saúde bucal, como escovação dental supervisionada e fluorterapia.

**12.** Sobre o Programa Brasil Sorridente, assinale a alternativa correta:

- a) O programa tem como foco principal o atendimento odontológico de alto custo.
- b) O programa oferta serviços odontológicos gratuitos e de forma integral no Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) O programa atua de forma isolada, sem interface com outras ações e programas do Ministério da Saúde.
- d) Os serviços do programa são ofertados exclusivamente em Unidades de Saúde da Família (USF).
- e) O programa não contempla ações de educação em saúde da população.

**13.** Pensando nas ações de educação em saúde, de acordo com o texto, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) As ações de educação em saúde realizadas fora da Unidade de Saúde devem seguir parâmetros diferentes das realizadas na Unidade de Saúde.
- b) As ações de educação em saúde devem conter informações sobre os efeitos da dieta, do fumo, do consumo de álcool e sobre o processo de adoecimento.
- c) Os conteúdos abordados nas ações de educação em saúde devem ser pedagogicamente trabalhados, preferencialmente de forma integrada com as demais áreas.
- d) As ações de educação em saúde podem ser realizadas utilizando o tempo de espera dos usuários na unidade de saúde.
- e) A participação de médicos e outros profissionais da Unidade, no planejamento e desenvolvimento das atividades, é fator muito importante.

**14.** Qual das seguintes alternativas descreve INCORRETAMENTE o papel da Atenção Primária à Saúde (APS) no SUS?

- a) É o primeiro ponto de contato do paciente com o sistema de saúde.
- b) Coordenar o cuidado do paciente na Rede de Atenção à Saúde (RAS).
- c) Oferecer cuidado integral e longitudinal.
- d) É responsável apenas por ações de promoção da saúde.
- e) Orientar o cuidado centrado na família e na comunidade.

**15.** A Odontologia Preventiva preconiza procedimentos curativos conservadores em locais como escolas e creches, qual das seguintes técnicas de remoção de dentina cariada é considerada a mais conservadora?

- a) Remoção completa da cárie até a dentina dura.
- b) Remoção seletiva da cárie com curetas.
- c) Remoção total e capeamento indireto.
- d) Remoção da cárie guiada por corantes indicadores.
- e) Nenhuma das anteriores.

## DENTÍSTICA

*Renata Barbosa*

**16.** Em relação ao amálgama dental, qual afirmação sobre a condensação é VERDADEIRA?

- a) A condensação é o processo de conversão do amálgama do estado plástico para o sólido.
- b) A condensação não influencia nas propriedades finais do amálgama.
- c) A condensação deve ser realizada com força mínima para evitar fraturas dentárias.
- d) A condensação é a compactação da liga dentro da cavidade preparada.
- e) Amálgamas esféricos exigem menos força de condensação do que as limalhas.

**17.** Qual das seguintes alternativas descreve corretamente a Odontologia Minimamente Invasiva (OMI)?

- a) A OMI foca na substituição de restaurações antigas, independentemente da presença de cárie ativa.
- b) A OMI prioriza a remoção completa de todo o tecido cariado infectado em todas as situações.
- c) A OMI enfatiza a prevenção da doença, a remineralização de lesões iniciais e o reparo de restaurações quando possível.
- d) A OMI desencoraja o uso de selantes e ART (Tratamento Restaurador Atraumático) por serem considerados invasivos.
- e) A OMI negligencia a importância do diagnóstico precoce e do controle da cárie.

**18.** O amálgama, por ser uma liga metálica de cor prateada, foi empregado por anos na Odontologia restauradora. Qual das seguintes NÃO é uma limitação do amálgama dental?

- a) Estética desfavorável.
- b) Ausência de união à estrutura dental.
- c) Necessidade de preparos cavitários invasivos.
- d) Liberação de flúor.
- e) Possibilidade de reação liquenóide.

**19.** Assinale a alternativa que descreve corretamente a classificação das cavidades?

- a) A Classe I de Black envolve as faces proximais de dentes posteriores com envolvimento do ângulo incisal.
- b) A Classe II de Black inclui cavidades em cicatrículas e fissuras de dentes posteriores e anteriores.
- c) A Classe V de Black localiza-se nas faces proximais de dentes anteriores sem envolvimento do ângulo incisal.
- d) A Classe IV de Black envolve o terço cervical das faces vestibulares e linguais de todos os dentes.
- e) A Classe VI de Black ocorre nas bordas incisais de dentes anteriores e pontas de cúspides.

**20.** A análise estética do paciente é um processo crucial para entender as suas necessidades e expectativas em relação à aparência física, permitindo que o profissional de saúde escolha o tratamento mais adequado. Aponte um fator essencial para realizar a Análise Estética do paciente.

- a) Restaurar o paralelismo adequado entre o plano oclusal e as linhas de referência horizontais.
- b) Restabelecer a altura ideal do terço médio da face.
- c) Recriar uma dominância posterior apropriada.
- d) Avaliar apenas a posição dos olhos e lábios.
- e) Realizar apenas o exame de perfil do paciente.

**21.** Qual das seguintes alternativas descreve INCORRETAMENTE uma limitação do clareamento dental?

- a) O clareamento pode causar sensibilidade dental.
- b) Pode ocorrer irritação gengival durante o clareamento.
- c) O clareamento não promove alterações na micromorfologia do esmalte.
- d) O clareamento de consultório pode causar ardência e inflamação nos tecidos moles.
- e) A técnica de clareamento não é influenciada pela concentração do agente clareador.

**22.** Qual das seguintes alternativas descreve CORRETAMENTE a atrição dental?

- a) Desgaste mecânico por interação com objetos extrínsecos.
- b) Desgaste químico por ação de ácidos.
- c) Desgaste na região da junção amelocementária por forças oclusais.
- d) Desgaste mecânico por contato dente a dente.
- e) Perda de estrutura dental no terço cervical decorrente do atrito da escova.

## CARIOLOGIA

*Cássia Reginato*

**23.** Qual das alternativas abaixo melhor descreve o principal mecanismo de ação do flúor na prevenção da cárie dentária?

- a) Aumento da dureza do esmalte, tornando-o imune aos ácidos.
- b) Apenas os meios coletivos permitem um real aumento da concentração de F na cavidade bucal.
- c) Inibição do crescimento bacteriano na placa dental.
- d) Manutenção do íon flúor na cavidade bucal, interferindo no processo de desmineralização e remineralização.
- e) Aceleração da produção de saliva, que neutraliza os ácidos.

**24.** Na ausência de água fluoretada, recomenda-se o uso regular de dentifrício fluoretado em conjunto com uma forma de uso tópico. Acerca dos meios coletivos de aplicação, julgue os itens abaixo

- I- O gel de flúor-fosfato acidulado necessita de supervisão, em especial quando aplicado com moldeiras e em crianças em idade pré-escolar, devido ao risco de ingestão.
- II- O a solução de NaF a 2% é indicada para bochecho semanal ou quinzenalmente.
- III- A recomendação de bochechos com NaF, com periodicidade semanal, são recomendados para populações que apresentem CPOD médio maior que 3 aos 12 anos de idade.

Assinale a alternativa correta

- a) Apenas I
- b) Apenas II
- c) Apenas III
- d) I e II
- e) I e III



**25.** Segundo o guia, qual a concentração ideal de flúor na água para a maior parte do território brasileiro?

- a) 0,5 ppm
- b) 0,6 ppm
- c) 0,7 ppm
- d) 0,8 ppm
- e) 1,0 ppm

**26.** De acordo com o Guia de Recomendações para uso de fluoretos no Brasil, o dentifrício fluoretado apresenta uma ação benéfica na prevenção das cáries porque aumenta a concentração de flúor na saliva por cerca de \_\_\_\_\_ após a escovação. Complete a lacuna com o valor citado pelo guia:

- a) 30 min
- b) 40 min
- c) 60 min
- d) 90min
- e) 180min

**27.** O Guia de Recomendações para uso de fluoretos no Brasil ressalta a importância do uso de dentifrícios fluoretados. Qual a concentração máxima de flúor permitida pela legislação brasileira nesses produtos?

- a) 0,05% de F
- b) 0,10% de F
- c) 0,15% de F
- d) 0,20% de F
- e) 0,22% de F

**28.** Qual o principal fator de risco para o desenvolvimento de fluorose dentária, de acordo com o guia?

- a) Uso de água fluoretada após os 12 anos de idade.
- b) Alto peso corporal em idade pré-escolar.
- c) Aumento da ingestão média de fluoretos por meio de múltiplas fontes.

d) Uso de dentifrício fluoretado em crianças acima de 8 anos.

e) Fatores genéticos predisponentes.

**29.** Em relação à escovação dental supervisionada, qual das alternativas descreve a modalidade "indireta"?

- a) Realizada por profissionais de saúde com avaliação individual do desempenho.
- b) Focada na remoção do biofilme dental e orientação sobre a qualidade da escovação.
- c) Realizada por agentes não necessariamente profissionais de saúde, com foco em levar flúor à cavidade bucal.
- d) Nesta modalidade a qualidade da escova é avaliada quanto ao desgaste, deformação das cerdas e outros aspectos, e que escovas e cremes dentais são distribuídos.
- e) Exclusiva para crianças com alta prevalência de cárie e realizada diariamente.

**30.** Assinale a alternativa incorreta do Guia de Recomendações para uso de fluoretos no Brasil no que diz respeito a supervisão de crianças e utilização de fluoretos.

- a) Crianças abaixo de seis anos não devem utilizar bochechos com soluções fluoretadas pelo risco de ingestão repetida.
- b) Limitar a frequência de escovação a duas vezes ao dia.
- c) Crianças abaixo de seis anos de idade têm risco aumentado para o desenvolvimento de fluorose e devem ser supervisionadas.
- d) Aplicar uma quantidade de dentifrício equivalente a uma ervilha ou grão de arroz (no máximo 0,3 g por escovação) em crianças abaixo dos 6 anos.
- e) Utilizar apenas dentifrício não fluoretado em crianças em idade pré-escolar.

**PERIODONTIA***Stefania Possamai*

**31.** Qual é a indicação da Cureta Gracey 11/12?

- a) Dentes anteriores.
- b) Detectar a presença de furca.
- c) Face distal dos dentes posteriores.
- d) Faces livres dos dentes posteriores.
- e) Face mesial dos dentes posteriores.

**32.** Dentre os patógenos periodontais, são considerados periodontopatógenos do grupo laranja:

- a) *A. actinomycetemcomitans*.
- b) *T. forsythia*.
- c) *P. gingivalis*.
- d) *P. intermedia*.
- e) *S. sanguis*.

**33.** A fase da doença, de acordo com Page & Schroeder, que apresenta perda de inserção, sendo a transição entre a gengivite e a periodontite é:

- a) Sadiá.
- b) Inicial.
- c) Precoce.
- d) Estabelecida.
- e) Avançada.

**34.** Envolvimentos de furca quando há profundidade à sondagem horizontal > 3 mm a partir de duas ou mais entradas geralmente representa uma destruição total dos tecidos de sustentação na furca:

- a) Classe I
- b) Classe II
- c) Classe IV
- d) Classe V
- e) Classe III

**35.** A respeito dos exames clínicos e radiográficos em periodontia, é correto afirmar que:

- a) A profundidade de sondagem é a distância da margem gengival ao fundo da bolsa periodontal.
- b) A mobilidade da coroa de um dente que ocorre nos sentidos vertical e horizontal é classificada como grau 1.
- c) O método preconizado para a avaliação de furca é a sonda exploradora.
- d) Durante o procedimento de sondagem, deve-se aplicar uma força exacerbada a fim de avaliar com fidelidade as medidas de sondagem.
- e) A profundidade da bolsa periodontal deve ser avaliada ao raios-x em todos os elementos dentários.

**36.** Retração gengival que ocorre sem perda óssea interproximal, porém ultrapassa a linha mucogengival corresponde a qual classe, de acordo com Miller:

- a) classe I
- b) classe II
- c) classe III
- d) classe IV
- e) classe V

**37.** A técnica de escovação na qual a cabeça da escova entra no sulco, atingindo até 01 mm subgengivalmente é:

- a) Stillman.
- b) Bass.
- c) Charters.
- d) Neumann.
- e) Stillman modificada.

**38.** Os tecidos periodontais se originam do ponto de vista embriológico do:

- a) folículo dentário.
- b) papila dentária.
- c) estomodeo.
- d) órgão dental.
- e) epitélio juncional.

**39.** Cimento presente no terço apical das raízes e nas áreas de furca. Ele contém tanto fibras extrínsecas quanto intrínsecas, assim como cementócitos. É formado durante todo o período funcional do dente. Trata-se do:

- a) cimento celular estratificado misto.
- b) cimento acelular afibrilar.
- c) cimento celular afibrilar.
- d) cimento afibrilar de fibras intrínsecas.
- e) cimento celular de fibras intrínsecas.

**40.** Corresponde ao tipo celular predominante no tecido conjuntivo gengival.

- a) queratinócito
- b) fibroblasto
- c) células de langherhans
- d) células de merckel
- e) melanócitos

## ENDODONTIA

*Mirela Barreto*

**41.** Em relação às fibras nervosas presentes na polpa dentária e à sua associação com os tipos de dor, assinale a alternativa correta:

- a) As fibras do tipo C são mielinizadas, lentas e responsáveis pela dor aguda, fugaz e localizada.
- b) As fibras A- $\beta$  possuem função bem estabelecida na condução da dor e são as mais abundantes na polpa radicular.
- c) As fibras do tipo A são amielínicas e possuem baixa velocidade de condução, sendo responsáveis pela dor espontânea e difusa.
- d) As fibras A-delta são mielinizadas, conduzem estímulos com velocidade intermediária e estão associadas à dor aguda e rápida provocada.
- e) As fibras simpáticas pós-ganglionares são responsáveis pela formação do plexo de Rashkow e conduzem estímulos de vibração e pressão.

**42.** Sobre as manifestações clínicas e o diagnóstico diferencial das alterações pulpares e perirradiculares, assinale a alternativa correta:

- a) A pulpíte reversível caracteriza-se pela dor espontânea, pulsátil e irradiada, geralmente aliviada por calor.
- b) O abscesso perirradicular agudo caracteriza-se por dor espontânea intensa, sensibilidade à percussão, mobilidade dentária e possível edema.
- c) A pulpíte crônica hiperplásica é comum em pacientes idosos, caracterizando-se por tecido granulomatoso evertendo da câmara pulpar.
- d) A pulpíte irreversível é uma condição sempre assintomática, sendo descoberta apenas por testes de vitalidade e radiografia.
- e) O abscesso perirradicular agudo é um processo inflamatório autolimitado, que requer prescrição de antibiótico em todos os casos.

**43.** Em relação à estrutura, função e composição da dentina e da polpa dentária, assinale a alternativa correta:

- a) A dentina intratubular é mais calcificada e rígida do que a dentina intertubular, sendo um importante fator de resistência mecânica.
- b) A dentina terciária reacional é formada por células-tronco recém-diferenciadas, após morte dos odontoblastos primários.
- c) A permeabilidade dentinária é maior na junção amelodentinária devido à menor densidade e menor diâmetro dos túbulos nessa região.
- d) A função formativa da polpa está relacionada exclusivamente à resposta imune frente a bactérias cariogênicas.
- e) A zona rica em células da polpa está localizada logo abaixo da pré-dentina e é responsável pela condução nervosa e vascular.

**44.** Sobre a anatomia interna dos segundos molares superiores, assinale a alternativa correta:

- a) Os segundos molares superiores apresentam tendência ao fusionamento radicular, sendo comum a presença de dois canais apenas – vestibular e palatino.
- b) As três raízes dos segundos molares superiores são mais volumosas e curvas do que as do primeiro molar superior.
- c) A configuração de canais em C é frequentemente observada em segundos molares superiores com raízes bem separadas.
- d) A raiz palatina dos segundos molares superiores é sempre reta e contém dois canais em 40% dos casos.
- e) A incidência de quatro canais nos segundos molares superiores é superior à observada nos primeiros molares superiores.

**45.** Em relação aos testes térmicos utilizados no diagnóstico em Endodontia, assinale a alternativa correta:

- a) O teste térmico a frio não é recomendado para dentes com coroas metalocerâmicas, pois o metal impede a condução térmica.
- b) A guta-percha aquecida pode ser aplicada diretamente nos dentes, como teste térmico auxiliar
- c) O teste elétrico é um recurso importante em dentes com ápice incompletamente formado
- d) A resposta negativa e isolada ao teste térmico a frio é sempre conclusiva de necrose pulpar
- e) O teste térmico a frio é o método mais confiável para avaliação da vitalidade pulpar, apresentando maior precisão diagnóstica em relação aos testes térmicos a quente e elétrico.

**46.** Sobre os instrumentos endodônticos e suas características estruturais, assinale a alternativa correta:

- a) O ângulo de transição entre a ponta e a haste é preferível à curva de transição, pois favorece o avanço do instrumento e reduz o risco de fraturas.
  - b) A parte de trabalho do instrumento é formada pela soma da haste de corte e da ponta, sendo responsável pela ação efetiva de corte no canal.
  - c) Os instrumentos tipo Hedström são confeccionados por torção e apresentam seção transversal triangular, com corte bilateral.
  - d) O diâmetro D0 corresponde ao limite final da haste de corte e D16, à extremidade do cabo do instrumento.
  - e) O comprimento da parte ativa dos instrumentos ISO varia de 21 a 31 mm, conforme o número da lima.
-

**47.** O hidróxido de cálcio exerce efeito antimicrobiano principalmente por:

- a) Inibição da bomba de sódio bacteriana.
- b) Liberação de cloro residual.
- c) Dissociação em íons cálcio e hidroxila, que alteram o pH e danificam a membrana e o DNA bacteriano.
- d) Estimulação da produção de anticorpos polimorfonucleares.
- e) Bloqueio competitivo dos receptores bacterianos de adesão.

**48.** Com base nas etapas cirúrgicas para a microcirurgia perirradicular (parendodôntica), é correto afirmar que:

- a) O retropreparo deve ser realizado em cavidade classe II, com 5 mm de profundidade, para garantir vedamento apical completo.
- b) A incisão mucogengival (Luebke-Oschenbein) é a técnica preferencial nos casos com bolsas periodontais profundas.
- c) O brunimento do material retro-obturador deve sempre ser feito com força máxima, independentemente do tempo de presa.
- d) O material retroobturador mais indicado é o cimento de ionômero de vidro.
- e) A apicetomia e o retroprepato não devem ser realizados concomitantemente, contraindicando os procedimentos de cirurgia parendodôntica em raízes curtas.

**49.** Na técnica híbrida de Tagger, a termoplastificação da guta-percha ocorre por:

- a) Aplicação direta de calor na ponta do cone principal com plugger aquecido.
- b) Rotação de um compactador de McSpadden em alta rotação nos dois terços coronários do canal.
- c) Uso combinado de calor e pressão com plugger vertical em todos os terços do canal.
- d) Injeção de guta-percha termoplastificada com carregadores revestidos.

e) Aplicação de pressão lateral com cones acessórios sob aquecimento progressivo.

**50.** Em relação às terapias para dentes imaturos com ápice aberto, assinale a alternativa que descreve corretamente a diferença entre apicigênese e apicificação:

- a) Ambas ocorrem exclusivamente em dentes com polpa necrosada e têm como objetivo o fechamento do forame apical.
- b) A apicigênese e a apicificação são indicadas para dentes com vitalidade parcial e visam alongamento radicular contínuo.
- c) A apicigênese correlaciona-se aos dentes com polpa vital e busca o desenvolvimento radicular fisiológico, enquanto a apicificação é indicada para dentes com necrose e visa formar uma barreira mineralizada no ápice.
- d) A apicigênese é realizada com tampão apical de MTA, enquanto a apicificação é feita por capeamento pulpar com hidróxido de cálcio.
- e) A apicificação promove o fechamento apical e o completo desenvolvimento radicular.

## ESTOMATOLOGIA

*Cássia Reginato*

**51.** O carcinoma epidermoide representa mais de 90% das neoplasias malignas orais. O carcinoma epidermoide de boca tem uma apresentação clínica variada, podendo ser evidenciado em vermelhão de boca ou intraoral. Qual das seguintes opções descreve a localização anatômica preferencial do carcinoma espinocelular intraoral?

- a) Lábios e gengiva
- b) Palato e assoalho da boca
- c) Língua e assoalho de boca
- d) Glândulas salivares menores
- e) Maxila e mandíbula



**52.** Qual das seguintes afirmações abaixo melhor descreve as características da queilite actínica?

- a) É mais comum em indivíduos de pele escura com histórico de exposição solar.
- b) Não pode ser considerada uma condição potencialmente maligna.
- c) A lesão ocorre em pessoas com idade inferior a 45 anos.
- d) A lesão pode surgir no local em que o paciente mantém um cigarro, charuto ou cachimbo.
- e) Há uma forte predileção pelo gênero feminino.

**53.** Qual das seguintes características é patognômica da candidíase pseudomembranosa?

- a) A lesão desaparece após a distensão da mucosa.
- b) Ocorre perda difusa de papilas filiformes do dorso da língua, resultando em uma aparência despilada e avermelhada na língua.
- c) Ocorrência exclusiva em pacientes com histórico de tratamento quimioterápico prolongado.
- d) Formação de placas brancas aderentes, com aparência de queijo cottage.
- e) Presença de vesículas que posteriormente ulceram na gengiva e lábios.

**54.** Sobre a hemorragia submucosa oral, assinale a alternativa incorreta.

- a) O trauma fechado na mucosa oral frequentemente resulta na formação de um hematoma.
- b) As hemorragias podem ser resultantes de infecções virais, especialmente a gonorreia.
- c) A equimose é o termo utilizado para qualquer acúmulo de sangue maior que 2 cm.
- d) O hematoma ocorre quando o acúmulo de sangue dentro dos tecidos produzir um aumento de volume.
- e) As petéquias e as púrpuras são menos conhecidas, podendo surgir devido à manobra de Valsalva.

**55.** Dentre as seguintes características clínico-radiográficas, a única que NÃO se aplica aos ameloblastomas multicísticos é:

- a) Não há predileção por gênero.
- b) São mais comuns em ramo e corpo mandibulares.
- c) Dor e parestesia são incomuns.
- d) Têm aspecto radiográfico de favos de mel.
- e) São prevalentes na segunda década de vida.

**56.** A sífilis é uma infecção crônica com distribuição mundial, causada pelo *Treponema pallidum*. O microrganismo é extremamente vulnerável ao meio seco, sendo os modos primários de transmissão o contato sexual ou da mãe para o feto. Analise as assertivas abaixo sobre a sífilis:

- I. A sífilis primária é caracterizada pelo cancro, que se desenvolve na área de inoculação, tornando-se clinicamente evidente de 3 a 90 dias após a exposição inicial.
- II. Durante a fase de sífilis secundária sintomas sistêmicos como a linfadenopatia indolor, dor de garganta, mal-estar, cefaleia, perda de peso, febre e dor musculoesquelética aparecem.
- III. Após o segundo estágio, os pacientes entram em um período assintomático, chamado sífilis terciária. Caso não seja tratada, pode levar ao desenvolvimento de uma inflamação granulomatosa, conhecida como goma, lesão endurecida que pode produzir destruição tecidual extensa.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Todas as afirmativas

**57.** A enfermidade contagiosa aguda causada pelo Paramyxoviridae que se caracteriza pelo aumento de volume das glândulas, que em geral começa de um lado, seguido de alterações glandulares contralaterais em poucos dias, é a:

- a) Rubéola.
- b) Sarampo.
- c) Catapora.
- d) Parotidite epidêmica.
- e) Herpes.

**58.** O vírus herpes simples (HSV) é um vírus DNA e um membro da família do herpesvírus humano (HHV), muito frequente na clínica odontológica. Sobre o HSV, analise as assertivas abaixo:

- I. A gengivoestomatite herpética aguda é o padrão mais comum de infecção primária sintomática pelo HSV, e mais de 90% dos casos são resultado da infecção pelo HSV-1.
- II. O HSV-1 se dissemina predominantemente por meio da saliva ou de lesões periorais ativas, adaptando-se melhor às regiões facial, oral e ocular.
- III. Mais de 15% dos casos de eritema multiforme são precedidos, em cerca de 3 a 10 dias antes, de uma recidiva sintomática do HSV.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas II e III.
- d) I, II e III.
- e) Nenhuma das alternativas.

**59.** Assinale o nome da doença que causa ulceração da face ventral da língua, causada por dentes natal ou neonatal é:

- a) Epstein
- b) Riga-Fede
- c) Bohn
- d) Starkey
- e) Noma

**60.** As opções a seguir apresentam lesões orais fortemente associadas com a infecção causada pelo HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), à exceção de uma. Assinale-a:

- a) Candidíase
- b) Leucoplasia pilosa
- c) Sarcoma de Kaposi
- d) Linfoma de Hodgkin
- e) Doença periodontal

## CIRURGIA ORAL MENOR

*Larissa Oliveira*

**61.** A cicatrização pós-operatória é uma resposta de defesa do organismo e depende do tipo e natureza do tecido envolvido. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta.

- a) A fase de proliferação ocorre de 3 a 5 dias após o procedimento cirúrgico.
- b) O reparo ocorre quando o tecido novo formado não apresenta diferenças funcionais ou estruturais do tecido de origem.
- c) O reparo ocorre através da formação de tecido fibroso e, por possuir uma menor quantidade de células, o tecido neoformado apresenta qualidade inferior ao que lhe deu origem.
- d) As etapas de cicatrização da ferida compreendem duas fases distintas: celular e vascular.
- e) Na fase de remodelação, o colágeno depositado anteriormente é substituído pelo tipo III.

**62.** O fórceps 87 é indicado para extração de qual elemento dentário?

- a) Molares inferiores.
- b) Molares superiores.
- c) Pré-molares inferiores.
- d) Pré-molares superiores.
- e) Caninos inferiores.

**63.** Após o procedimento cirúrgico, o dentista deve fornecer as instruções pós-operatórias ao paciente. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- a) Após a exodontia, como forma de hemostasia, o paciente deve ser instruído a morder a gaze seca firmemente pelo período mínimo de 30 minutos.
- b) A dieta nas primeiras 12 a 24 horas pós-operatórias deve ser hipercalórica, de consistência líquida, pastosa e fria.
- c) Não há restrições com relação à realização de viagens aéreas.
- d) Nas primeiras 24h, deve-se aplicar bolsa de água morna na face, sobre o lado operado, por 30min a cada 2h ou de forma contínua.
- e) Nos primeiros dias pós-operatórios, os pacientes devem realizar bochechos com clorexidina 0,12%.

**64.** Com relação aos terceiros molares impactados, assinale a alternativa correta.

- a) Um terceiro molar inferior classificado como 2B é considerado como de maior dificuldade cirúrgica.
- b) O molar inferior classificado como 1C é o de menor dificuldade cirúrgica.
- c) A angulação considerada mais difícil para um terceiro molar inferior é a horizontal.
- d) Um molar superior distoangulado é considerado o de menor dificuldade cirúrgica.
- e) Não há relação entre a dificuldade cirúrgica e a angulação do dente impactado.

**65.** Durante uma extração dentária, os fórceps podem aplicar cinco grandes movimentos para luxar dentes e expandir o alvéolo dental. Assinale a alternativa correta.

- a) O único objetivo da pressão apical é a expansão alveolar.
- b) O primeiro movimento a ser realizado com o fórceps é a pressão vestibular para expansão da lâmina vestibular, particularmente na crista óssea.
- c) Uma grande força apical é sempre útil e deve ser aplicada sempre que o fórceps for adaptado ao dente.
- d) A pressão rotacional causa alguma expansão interna do alvéolo dental e rompimento dos ligamentos periodontais, podendo ser aplicada em todos os dentes.
- e) A maioria dos dentes é removida apenas por forças vestibulares.

## OCCLUSÃO

*Larissa Oliveira*

**66.** A \_\_\_\_\_ é uma posição de acomodamento maxilo mandibular, onde a posição dentária ocorre com os maiores contatos oclusais. Assinale a alternativa que apresenta a palavra que preenche corretamente a lacuna.

- a) Dimensão vertical de repouso.
- b) Dimensão vertical de oclusão.
- c) Máxima intercuspidação habitual.
- d) Relação cêntrica.
- e) Dimensão horizontal de oclusão.

**67.** Sobre oclusão dentária, assinale a alternativa correta.

- a) Na oclusão mutuamente protegida, há proteção dos dentes posteriores nos movimentos excursivos pela guia anterior.
- b) Nos movimentos de lateralidade, o lado de trabalho é o contralateral à movimentação.
- c) A oclusão balanceada bilateral é indicada apenas para próteses totais.
- d) Em uma malocclusão de classe II, a cúspide mesiovestibular do primeiro molar permanente superior oclui no sulco mesiovestibular do primeiro molar permanente inferior.
- e) Em uma malocclusão de classe I, o sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior está distalizado com relação à cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior.

**68.** Sobre os arcos dentais permanentes, assinale a alternativa correta.

- a) O arco inferior é menor que o superior no diâmetro longitudinal.
- b) A curva de Spee é a curvatura dos dentes no sentido vestibulolingual, no plano frontal, que passa pelas cúspides vestibulares e linguais dos dentes posteriores de ambos os lados.
- c) A curva de Wilson também é chamada de curva de compensação sagital.
- d) A curva de Wilson vai de canino até o último dente do hemiarco, em direção à borda anterior do ramo ascendente da mandíbula.
- e) Além dos fatores intrínsecos, fatores extrínsecos também influenciam no formato dos arcos dentais.

## ANESTESIOLOGIA

*Mirela Barreto*

**69.** Sobre a metemoglobinemia induzida por anestésicos locais, assinale a alternativa correta:

- a) A metemoglobinemia está associada principalmente ao uso de lidocaína, especialmente quando combinada com epinefrina.
- b) Seus sinais clínicos são observados imediatamente após a aplicação do anestésico, ainda no consultório.
- c) A prilocaína, por seu metabólito ortotoluidina, pode causar oxidação da hemoglobina, ocasionando a metemoglobinemia.
- d) A presença de metemoglobinemia é indicativo absoluto para a suspensão do tratamento odontológico e encaminhamento hospitalar imediato, mesmo sem sintomas.
- e) Os anestésicos associados à metemoglobinemia são contraindicados em todos os pacientes.

**70.** Sobre as complicações locais e sistêmicas associadas à anestesia local em Odontologia, analise as afirmativas a seguir:

- I. A parestesia pode resultar de trauma direto ao nervo, solução contaminada ou neurotoxicidade, sendo mais frequentemente associada à articaína e à prilocaína.
- II. A fratura de agulha pode ocorrer com agulhas curtas e finas inseridas completamente, e sua prevenção inclui evitar inserção total e uso de agulhas dobradas.
- III. A anafilaxia é uma reação imune grave, dose-dependente, provocada por exposição prévia a alérgeno, sendo comum com anestésicos do tipo amida.

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I
- b) Apenas II
- c) Apenas I e III
- d) Apenas I e II
- e) I, II e III

**ODONTOLOGIA LEGAL***Juliana Sganzele*

**71.** De acordo com o Código de Ética Odontológica, o cirurgião-dentista está obrigado a manter o prontuário odontológico atualizado de seus pacientes. Com relação ao prontuário odontológico, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O prontuário deve ser armazenado obrigatoriamente em formato físico, pois o digital não tem validade jurídica.
- b) É facultativo o registro da evolução clínica nos casos de tratamento simples ou estético.
- c) O prontuário deve ser mantido por, no mínimo, 5 anos após o término do tratamento odontológico.
- d) A cópia do prontuário só pode ser entregue ao paciente mediante ordem judicial.
- e) O prontuário odontológico é documento de valor legal e deve conter a identificação do profissional responsável pelo atendimento.

**72.** Durante uma perícia odontológica em um processo trabalhista, o cirurgião-dentista foi nomeado como perito judicial. Com base no Código de Processo Civil e na atuação do perito, é CORRETO afirmar:

- a) O perito odontologista poderá ser substituído a qualquer momento a pedido das partes, sem necessidade de justificativa.
- b) O assistente técnico é nomeado pelo juiz e deve ser isento de vínculo com as partes envolvidas.
- c) O laudo pericial elaborado pelo odontologista deve conter fundamentação técnica, metodologia utilizada e resposta aos quesitos.
- d) O perito judicial atua exclusivamente em processos criminais, sendo vedada sua atuação em demandas civis ou trabalhistas.
- e) O perito é obrigado a prestar depoimento oral, mesmo que o laudo tenha sido claro e suficiente.

**73.** Com relação à identificação humana por meio da Odontologia Legal, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A análise da arcada dentária é útil em corpos carbonizados, uma vez que os dentes são estruturas altamente resistentes ao calor.
- b) A queiloscopia é uma técnica que analisa o padrão das rugas palatinas para fins de identificação.
- c) As próteses e implantes dentários podem conter elementos de identificação individual do paciente.
- d) O confronto entre dados antemortem e postmortem pode ser suficiente para uma identificação positiva mesmo sem exame de DNA.
- e) A odontologia legal é um dos métodos primários de identificação recomendados em desastres em massa, segundo protocolo da Interpol.

**74.** Assinale a alternativa que apresenta uma conduta que configura infração ética grave na prática do cirurgião-dentista, segundo o Código de Ética Odontológica:

- a) Realizar exame pericial mesmo estando impedido de atuar por laços de parentesco com uma das partes.
- b) Elaborar laudo pericial e encaminhá-lo diretamente ao paciente, sem passar pelo juízo.
- c) Recusar-se a atender um paciente fora do horário estabelecido de consulta.
- d) Utilizar biomateriais de origem xenógena previamente autorizados pela ANVISA.
- e) Indicar a complementação de exame radiográfico mesmo sem haver sintoma clínico evidente.



**75.** Durante a análise de um cadáver em avançado estado de decomposição, um odontologista realiza comparação entre dados antemortem e os registros dentários postmortem. Sobre esse processo de identificação, é CORRETO afirmar:

- a) A estimativa de idade em adultos é feita com base na erupção dentária.
  - b) O método de Gustafson é aplicável em crianças e adolescentes em fase de dentição mista.
  - c) A correspondência de número e posição de restaurações pode ser um elemento decisivo na identificação.
  - d) A arcada dentária não é útil para identificação em cadáveres esqueletizados.
  - e) O exame de DNA é sempre obrigatório para confirmação da identidade.
-

## O QUE VOCÊ ACHOU DESTE SIMULADO?

*Conte-nos como foi sua experiência ao fazer este simulado.*

*Sua opinião é muito importante para nós!*

<https://forms.gle/3RC8pkHLNAnpSnxQ9>

## NÃO É ASSINANTE?

*Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!*

<http://estrategi.ac/assinaturas>

## CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

*Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!*

<http://estrategi.ac/ok1zt0>

---